

Jalostuksen tavoiteohjelma 2027 - 2031

[Venäjänvinttikoiria]

Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi]
SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt [pp.kk.vuosi]

[kuva rodun tyypillisestä edustajasta]

Sisällysluettelo

1. YHTEENVETO	2
2. RODUN TAUSTA	3
3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA	5
4. RODUN NYKYTILANNE	6
4.1. POPULAATION RAKENNE JA JALOSTUSPOHJA.....	6
4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos.....	7
4.1.2 Jalostuspohja	7
4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa	10
4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostus pohjasta	11
4.2 LUONNE JA KÄYTTÄYTYMINEN SEKÄ KÄYTTÖOMINAISUUDET.....	11
4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun käyttötarkoituksesta...	11
4.2.2 Jakautuminen näyttely- / käyttö- / tms. -linjoihin	11
4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai käyttöominaisuuksien testaus ja/tai kuvaus	12
4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa	12
4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet	15
4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen	17
4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista sekä niiden korjaamisesta	18
4.3. TERVEYS JA LISÄÄNTYMINEN.....	19
4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet ja viat.....	19
4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet ja viat	19
4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt	22
4.3.4 Lisääntyminen	23
4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet	23
4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä.....	24
4.4. ULKOMUOTO	24
4.4.1 Rotumääritelmä.....	24
4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset	24
4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus	25
4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista	25
5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA	25
5.1 KÄYTETTYMPIEN JALOSTUSKOIRIEN TASO.....	25
5.2 AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMINEN	25
6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS	27
6.1 JALOSTUKSEN TAVOITTEET KAUELLE 2027 - 2031.....	27
6.2 SUOSITUKSET JALOSTUSKOIRILLE JA YHDISTELMILLE	27
6.3 ROTUJÄRJESTÖN TOIMENPITEET	28
6.4 UHAT JA MAHDOLLISUUDET SEKÄ VARAUTUMINEN ONGELMIIN	28
6.5 TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITEOHJELMAN SEURANTA.....	29
7. LÄHTEET	29
8. LIITTEET	30

1. YHTEENVETO

Venäjänvinttikoiria on kotoisin Venäjältä. Venäläiset ylimykset ryhtyivät 1500-luvulla jalostamaan uutta metsästyskoirarotua, jonka tuli olla rohkea ja voimakas, mutta samalla ketterä ja jalo ulkomuodoltaan. Tiedot ensimmäisistä Suomeen tuoduista venäjänvinttikoirista löytyvät 1890-luvulta, mutta uuden kasvatustyön katsotaan alkaneen 1960-luvun alussa. Nykyisin rekisteröidään vuosittain 30–80 pentua sekä toistakymmentä tuontikoiraa.

Venäjänvinttikoiran käyttötarkoitus rotumääritelmän (FCI 2019) mukaisesti on metsästävä vinttikoiria, rata- ja maastajuoksukoiria. Nykyisin venäjänvinttikoiria on Suomessa ihmisen seuralainen, jota käytetään myös monipuolisena harrastuskoirana.

Keskeisimmät jalostustavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi

Rodun terveys ja luonne ovat tällä hetkellä tilastojen ja kyselyiden perusteella keskimäärin hyvät. Venäjänvinttikoirien eli borzoiden jalostuksen tavoite on säilyttää rodun alkuperäiset hyvät ominaisuudet. Jalostusentavoiteohjelmaan on koottu tietoa rodun nykytilanteesta ja tavoitteita, mihin suuntaan rodun toivotaan kehittyvän. Tavoiteohjelman avulla pyritään ylläpitämään ja kehittämään rodun ulkomuotoa, luonnetta, terveyttä ja käyttöominaisuuksia.

Luonne ja käyttäytyminen	
Tavoitteet	PEVISA, jalostussuositukset, muut toimenpiteet
Jalostukseen käytetään tasapainoisen luonteen omaavia koiria.	Järjestetään käyttäytymisen jalostustarkastustilaisuuksia. Valmistellaan luonne- ja kotikäyttäytymiskysely ja toteutetaan kysely ennen seuraava jalostuksen tavoiteohjelman valmistelua.

Terveys	
Tavoitteet	PEVISA, jalostussuositukset, muut toimenpiteet
Estetään DM-alttiiden pentujen syntyminen.	Vähintään toinen pentueen vanhemmista on DM:n suhteen "terve" eli testaustulos on N/N. Ylläpidetään tiedostoa DM-tutkimusten osalta ja pyritään saamaan tutkimukset osaksi Kennelliiton jalostustietojärjestelmää.
Kaikille jalostukseen käytettäville koirille on tehty kattavat sydän-, luusto- ja silmätutkimukset.	Lisätään jalostuskoirien tutkimusaktiivisuutta esimerkiksi järjestämällä joukkotarkastusmahdollisuuksia.
Huolehditaan rodun kokonaisterveydestä kiinnittämällä huomioita myös sairauksiin ja vikoihin, joille ei ole käytössä seulovaa testausta.	Valmistellaan terveys- ja lisääntymiskysely ja toteutetaan kysely ennen seuraava jalostuksen tavoiteohjelman valmistelua.

Lisääntyminen	
Tavoitteet	PEVISA, jalostussuositukset, muut toimenpiteet
Vaalitaan rodun ongelmatonta lisääntymistä.	Lisääntymisongelmaista koiraa ei tule käyttää jalostukseen.

Rakenteen ja anatomian terveys	
Tavoitteet	PEVISA, jalostussuosituksset, muut toimenpiteet
Vaalitaan rodun terveyttä ja tervettä rakennetta.	Molemmilla vanhemmilla on vähintään laatuarvostelun ”erittäin hyvä” -palkinto virallisesta näyttelystä vähintään 15kk iässä.
Tavoitteena on kapeiden alaleukojen vähentäminen siten, että hampaista ei aiheudu koiralle terveydellistä haittaa.	Koiraa, jolla on purentavika tai niin kapea alaleuka, että alakulmahampaat osuvat kitalakeen, ei tule käyttää jalostukseen. Ulkomuototuomareita pyritään kouluttamaan ongelman tunnistamiseksi.

Käyttöominaisuudet	
Tavoitteet	PEVISA, jalostussuosituksset, muut toimenpiteet
Vaalitaan rodun käyttöominaisuuksien säilymistä.	Molemmilla vanhemmilla on hyväksytty tulos joko rata-, maasto- tai ajuejuoksukokeista.

Jalostuspohja	
Tavoitteet	PEVISA, jalostussuosituksset, muut toimenpiteet
Tavoitteena on populaation kasvattaminen ja rodun monimuotoisuuden turvaaminen.	Jalostuspohjaa laajennetaan aktiivisesti ulkomaille joko tuontikoirien, tuontisperman tai muun yhteistyön kautta.

Pentueiden rekisteröintiin vaikuttavat ehdot

Venäjänvinttikoiralla ei ole Pevisaa tai muita rekisteröintiä rajoittavia ehtoja.

2. RODUN TAUSTA

Alkuperä ja käyttötarkoitus

1500-luvulla venäläiset ylimykset pääsivät ajometsästyksen makuun ja ryhtyivät jalostamaan uutta koirarotua, jonka haluttiin perivän hirvikoiran ja koutsin parhaat ominaisuudet. Hirvikoiria oli pystykorvainen, laikatyypinen koira, mutta niin iso ja vahva, että se pystyi saavuttamaan ja kaatamaan niin peuran kuin hirvenkin. Koutsi oli siro ja kevytrakenteinen koira, jolla oli runsashapsuiset korvat ja häntä. Se kehittyi afrikkalaisen kantavinttikoiran (tesem) ja keskiaasialaisen vuoristokoiran sekoituksesta. Kurtzi / koutsi tuli Venäjälle tataarien mukana arabien asuttamilta alueilta. Se on kaukaista sukua nykyiselle salukille ja hyvin läheistä sukua tazyille. Hirvikoiria periytti jälkeläisilleen vireyden, rohkeuden ja voiman, kyvyn huikeaan spurttiin lyhyillä matkoilla sekä paikalliseen ilmastoon sopivan tiheän turkin. Koutsi puolestaan periytti kepeyden ja liikkeiden hienostuneisuuden, vinttikoiramaisen ulkomuodon sekä kyvyn laukata pitkiäkin matkoja avonaisessa maastossa.

1600-luvulle tultaessa oli kehittynyt niin sanottu ”vanhan ajan venäjänvinttikoiria” (psovaja borzaja). Sillä oli pitkänä roikkuva kihartuva karva ja myös muilta osin se muistutti hyvin paljon nykyistä venäjänvinttikoiraa. Alkoi ajometsästyksen kulta-aika, joka kesti aina vuoteen 1861 asti. Ylimystön suurtiloilla oli kymmenien, jopa satojen koirien kenneleitä, joissa kasvatettiin venäjänvinttikoiria suden metsästykseseen, mutta myös ketun ja jäniksen ajoon.

1700-luvulla Venäjällä pidettiin pitkäkarvaisten venäjänvinttikoirien lisäksi erilaisia karkeakarvaisia vinttikoiria, kuten klokeja, skotlanninhirvikoiria ja irlanninsusikoiria, mutta myös sileäkarvaisia – chart polskeja ja greyhoundeja ja muitakin sileäkarvaisia, nyttemmin jo jäljettömiin kadonneita vinttikoirarotuja. Eri rotuja myös risteytettiin keskenään.

1700-luvun lopulta löytyy ensimmäiset maininnat tiheäkarvaisista venäjänvinttikoirista (gustopsovaja borzaja), joilla oli hyvin tiheä, pitkä ja kiharainen turkki sekä pitkät hapsut hännässä. 1800-luvun alkupuoliskolla tuotiin Venäjälle kurdilaisia eli itäisiä vuoristovinttikoiria. Ne olivat leveälanteisia, toisinaan syntymästään töpöhäntäisiä tai hännättömiä koiria, jotka muistuttivat ulkomuodoltaan vuoristotyyppistä salukia. Niiden tärkeimpiä ominaisuuksia olivat erittäin vahvat ja kovat polkuanturat, erinomainen ketteryys, kyky pitkään ajoon ja suunnaton hinku riistan perään. Niitä risteytettiin runsaasti venäjänvinttikoiraan. Myös salukityypistä kriminvinttikoiraa risteytettiin venäjänvinttikoiraan. Näin syntyi lyhytkarvainen (tshistopsovaja) venäjänvinttikoiria.

1800-luvun puolessavälissä oli venäjänvinttikoirasta muodostunut kolme perustyyppiä, joista karvapeitteen laadun mukaan käytettiin seuraavia nimityksiä: tiheäkarvainen (gustopsovaja), pitkäkarvainen (psovaja) ja lyhytkarvainen (tshistopsovaja). Kahden ensin mainitun luonteenomaisin tunnusmerkki oli pitkä, hieno, hapsuinen karva kaikkialla muualla paitsi kuonossa, päässä, korvissa ja jaloissa. Lyhytkarvaisella oli pitkää hapsuista karvaa vain reisissä, kaulan sivuilla ja hännässä.

Vuonna 1861 Venäjällä lakkautettiin talonpoikien maaorjuus ja monet metsästyskenneleiden omistajat alkoivat palveluskunnan menetettyään pyrkiä eroon koiristaan. Lakkautettujen kenneleiden parhaat yksilöt luovutettiin kuitenkin sopuhintaan uusille venäjänvinttikoiraharrastajille. Venäjänvinttikoirien lukumäärä laski jyrkästi. Toisaalta tämän tiukan karsinnan ansiosta tämän päivän venäjänvinttikoiria on säilyttänyt ulkomuotonsa ja metsästystaitonsa. Kenneltoiminta keskittyi harvalukuisten, urheilumetsästystä harrastavien tilanomistajien käsiin. Edellä mainitut venäjänvinttikoiratyytit sekoittuivat vähitellen toisiinsa ja rodun perusominaisuudet vakiintuivat. Venäjänvinttikoiraharrastajat kokoontuivat 1875 Moskovaan ensimmäiseen yhteiseen kokoukseen, jossa todettiin, että silloisella koirakannalla tuskin onnistuttaisiin säilyttämään erillisinä kaikkia kolmea rotutyyppiä.

Vuonna 1888 laadittiin ensimmäinen rotumääritelmä venäjänvinttikoirasta. Tärkeimmät metsästyskennelit alkoivat kehittää omia tyyppejään; perchino, oseroff, boldareff, tselischtscheff, sumarokoff, gejeroff ja bibikoff. Linjojen väliset muunnokset ovat erittäin tärkeitä, koska venäjänvinttikoirat, joita tuotiin Britanniaan, Eurooppaan ja Amerikkaan, olivat eri kenneleistä.

Venäjänvinttikoiran kasvatus koki suuria vaikeuksia vuoden 1917 vallankumouksen jälkeen, kun metsästystilat lopullisesti hävitettiin. Pakolaiset ja maastamuuttajat veivät ulkomaille runsaasti venäjänvinttikoiria. Venäjälle jääneet venäjänvinttikoirat eivät ilmeisestikään olleet kaikkein parhaimpia valioyksilöitä. Kenneltoiminta keskittyi lopulta Moskovaan ja Pietariin (Leningrad). Toisen maailmansodan aikana venäjänvinttikoirien lukumäärä hupeni vähiin. Samaan aikaan perustettiin kuitenkin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa lukuisia venäjänvinttikoirakenneleitä. Toisen maailmansodan jälkeen käynnistyi Venäjälläkin venäjänvinttikoiran uusi tuleminen.

Tiedot ensimmäisistä Suomeen tuoduista venäjänvinttikoirista löytyvät 1890-luvulta. Suomen Kennelklubin varapuheenjohtaja Volmari Kanninen omisti Lastotschka-nimisen nartun (synt. 5.5.1892 Pietarissa, kasvattaja A. Stetskevits). Vuonna 1894 syntyi Suomessa ensimmäinen pentue, jonka kasvattajana oli Pitkärannan tehdas.

Vuosien kuluessa tuotiin Venäjältä useita koiria. Kanta alkoi kasvaa 1930-luvulla. Vuosina 1933 ja 1934 teetti everstiluutnantti A. Paasonen pentueet Uslad-uroksella ja Jorza-nartullaan. Saksasta tuotettu narttu Felizia vom Nordseestrand sai pari pentuetta Renaldo-kennelnimellä, kasvattajana E. Olander. Sodan aikana kanta pääsi kuitenkin kokonaan häviämään.

Vuonna 1946 tuottivat Daisy ja Yrjö Eskola Ruotsista urokset Ch Bonnens Fedja ja Bojar. Lisäksi he tuottivat Ruotsista nartun Kicki. Bojar ja Kicki olivat mustavalkoisia ja niillä oli yksi pentue av Moccambo -kennelnimellä. Pennuista nartut Gisela ja Mariza saavuttivat valionarvon. Kasvatustyö kuitenkin valitettavasti loppui tähän.

Uuden kasvatustyön voidaan katsoa alkaneen 1960-luvun alussa. Leena Harrivaara tuotti Vasaravuoren kenneliinsä Saksasta nartun Caljuschka von Karaganda ja Sveitsistä sisarukset Ivanna ja Iaga de Norois. Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliitto tuotti Neuvostoliitosta uroksen Udaloj ja nartut Raketa ja Metschta. Näiden koirien jälkeläiset olivat kantakoirina uusille kenneleille, joista mainittakoon of Golden-West, Korotai, Amu-Darjan sekä Bolshoi. Seuraavasta sukupolvesta aloittivat kasvatustyönsä Metsänreunan, Polongain ja of Oak-Backwood-kennelit. 1980-luvulla aloittivat kasvatustyönsä lukuisat uudet kennelit, joista laajinta kasvatustyö on ollut Margiitan, Rajalinjan, Kaznan ja Rainmaker kenneleissä.

Suomen presidentti Urho Kekkonen sai 1970-luvun alkupuolella Neuvostoliitosta lahjaksi kaksi venäjänvinttikoiraa, Leon ja Ludmilan. Molempia käytettiin jalostukseen, mutta vain Leon jälkeläiset vaikuttavat edelleen nykyisessä koirakannassa.

Venäjänvinttikoiria on kehittynyt 1960-luvulta sekä määrällisesti että laadullisesti. Rodun rekisteröintimäärät kasvoivat 1970-luvulla ennätysvuoden ollessa 1974, jolloin rekisteröitiin 153 koiraa. Nykyisin rekisteröidään vuosittain 20–70 pentua sekä toistakymmentä tuontikoiraa. Koiria on viime vuosina tuotu Virossa, Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Tšekistä, Unkarista, Sveitsistä, Saksasta, Ranskasta, Hollannista, Englannista, Ruotsista, Norjasta sekä Yhdysvalloista.

Suomen Kennelliitto (SKL) päätti keskeyttää 15.3.2022 alkaen Venäjän ja Valko-Venäjän rekisterissä olevien koirien rekisteröinnin Ukrainan sotatilanteen takia. Kaikkia tuontikoiria ei muutoinkaan rekisteröidä Suomen Kennelliittoon, jolloin ne puuttuvat tuontitilastoista.

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA

Suomen Borzoiklubi – The Finnish Borzoi Club ry (SBK) on perustettu 25.6.1976. SBK:n kotipaikka on Helsinki ja toimialue koko maa. Jäsenmäärä on noin 250. Yhdistys toimi aluksi rotua harrastavana yhdistyksenä, jolloin rotujärjestö oli Suomen Vinttikoiraliitto ry (SVKL). Vuodesta 2008 lähtien SBK on ollut myös venäjänvinttikoirien rotujärjestö.

SBK pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevät- ja syyskokouksen. Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valitun puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Kaksi jäsentä valitaan aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja kaksi eroaa vuoron mukaan joka vuosi. Lisäksi valitaan vuosittain kaksi varajäsentä.

Hallitus nimeää jalostustoimikunnan puheenjohtajan, joka kokoaa tarvittavan määrän jäseniä jalostustoimikuntaan. Jalostustoimikunnan toimikausi on kaksi vuotta. Jalostustoimikunnan tehtäviin kuuluu neuvonta ja jalostuksen ohjaus, rodussa esiintyvien sairauksien, rakenne- ja luonneongelmien kartoittaminen sekä niiden ehkäisy ja vähentäminen, sekä rodun monimuotoisuuden ylläpitäminen ja lisääminen tiedottamisen ja neuvonnan avulla.

4. RODUN NYKYTILANNE

4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja

Rodun elinvoimaisuuden ja pitkäjänteisen säilyttämisen kannalta on välttämätöntä, että sen jalostuspohja on mahdollisimman laaja ja perinnöllisesti monimuotoinen. Laaja jalostuspohja edistää perinnöllisen vaihtelun säilymistä ja ehkäisee tilanteita, joissa rodun terveys, lisääntymiskyky tai sopeutumiskyky heikentyvät perimän yksipuolistumisen seurauksena. Erilaisten sukulinjojen ja rodulle tyypillisten ominaisuuksien säilyttäminen edellyttää, että jalostuksessa hyödynnetään tasapainoisesti rodun eri linjoja ja että jalostusvalintoja tehdään pitkäjänteisesti populaation kokonaistilanne huomioiden.

Populaation rakennetta ja jalostuspohjan riittävyttä arvioidaan ensisijaisesti tarkastelemalla jalostukseen käytettyjen koirien määrää ja jalostusmateriaalin jakautumista rodun sisällä. Tämän arvioinnin keskeinen mittari on tehollinen populaatiokoko, joka kuvaa sitä osaa populaatiosta, joka tosiasiallisesti siirtää perimäänsä seuraaville sukupolville. Tehollisen populaatiokoon perusteella voidaan myös arvioida rodun geneettistä riskiä: kun tehollinen koko laskee alle sadan, populaatiota pidetään jo vaarantuneena geneettisen monimuotoisuuden näkökulmasta, ja jos tehollinen koko lähestyy viidenkymmenen rajaa, populaatiota uhkaa sukupuuttoon johtava perinnöllisen monimuotoisuuden menetys ja nopeasti nouseva sukusiitos. Tehollinen populaatiokoko kertoo usein erityisesti siitä, kuinka elinkelpoinen ja geneettisesti tasapainoinen kotimainen rodun alapopulaatio on ilman tuontikoirien tuomaa geneettistä lisäpanosta.

Arvioinnin keskeisiä osa-alueita ovat jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen lukumäärä sekä se, kuinka suuri osa kokonaispopulaatiosta osallistuu jalostukseen. Jalostuspohja kaventuu, mikäli jalostukseen käytetään vain rajallista määrää koiria tai jos yksittäiset yksilöt saavat huomattavan suuren jälkeläismäärän suhteessa muuhun populaatioon. Liian suuret jälkeläismäärät yhdellä koiralla tai sukulinjalla voi johtaa sukusiitoksen nopeaan kasvuun tulevissa sukupolvissa, kun valtaosa rodun yksilöistä on sukua keskenään. Tällöin rotu on myös äärimmäisen riippuvainen eri sukuisista tuontikoirista.

Perinnöllisen monimuotoisuuden tasoa voidaan arvioida seuraamalla populaation sukusiitoksen tasoa ja sen kehitystä. Sukusiitosaste kuvaa sitä, kuinka läheistä sukua jalostukseen käytettävät koirat ovat keskenään ja kuinka suuri osa koiran perimästä on samoista esivanhemmista peräisin olevia geeniversioita. Mitä korkeampi sukusiitosaste on, sitä enemmän perinnöllinen vaihtelu kaventuu ja sitä suurempi on perinnöllisten sairauksien ja elinvoiman heikkenemisen riski populaatiossa. Arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota erityisesti sukusiitoksen kasvunopeuteen, koska se kertoo populaation todellisesta geneettisestä riskistä. Sukusiitoksen kasvu yli yhden prosentin koirasukupolvea kohden (vastaa tehollista populaatiokokoa 50) merkitsee selkeää riskiä sukusiitostaantumien kehittymiselle. Sukusiitostaantuma voi ilmetä muun muassa heikentyneenä elinvoimana, lisääntyvän pentukuolleisuuden muodossa tai perinnöllisten sairauksien yleistymisenä.

Roduille, joiden taustalla on merkittävä määrä ulkomaista jalostusmateriaalia, sukusiitosarvojen tulkintaan liittyy erityisiä rajoitteita. Suomen Kennelliiton tietokantaan tallentuu vain rajallinen määrä sukupolvia maahan tuoduista koirista, mikä voi johtaa tilanteeseen, jossa laskennallinen sukusiitosarvo aliarvioi todellista geneettistä tilannetta. Laskelmien luotettavuus riippuu suoraan käytettävissä olevien sukupolvien määrästä.

Näiden arviointimenetelmien avulla muodostetaan kokonaiskuva suomalaisen populaation geneettisestä tilanteesta ja tunnistetaan ne toimenpiteet, joilla rodun monimuotoisuus ja jalostuspohjan riittävyys voidaan turvata myös tulevaisuudessa.

4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos

Taulukko 1. Vuositalasto – Vuosina 2016–2025 rekisteröidyt pentueet

Lähde: Jalostustietojärjestelmä (30.3.2026)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Pennut (kotimaiset)	39	21	70	16	50	43	39	29	44	53
Tuonnit	12	13	7	12	20	14	20	20	10	14
Rekisteröinnit yht.	51	34	77	28	70	57	59	49	54	67
Pentueet	7	5	11	3	7	9	7	7	8	10
Pentuekoko	5,6	4,2	6,4	5,3	7,1	4,8	5,6	4,1	5,5	5,3
Kasvattajat	7	5	10	2	6	8	6	7	8	9
jalostukseen käytetyt eri urokset										
- kaikki	7	5	11	3	7	7	7	7	7	10
- kotimaiset	4	3	7	2	5	2	4	3	3	3
- tuonnit	1	2		1	1	4	3	2	1	5
- ulkomaiset	2	0	4	0	1	1	0	2	3	2
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä	4 v 8 kk	4 v 4 kk	3 v 10 kk	3 v 9 kk	2 v 8 kk	4 v 11 kk	7 v	5 v 6 kk	5 v	4 v 1 kk
jalostukseen käytetyt eri nartut										
- kaikki	7	5	11	3	7	9	7	7	8	10
- kotimaiset	3	2	7	3	6	3	4	7	5	9
- tuonnit	4	3	4		1	6	3		3	1
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä	4 v 8 kk	5 v 8 kk	4 v 5 kk	6 v 7 kk	4 v 8 kk	5 v 2 kk	5 v 10 kk	5 v 7 kk	5 v 10 kk	5 v 3 kk
Isoisät	13	8	20	6	12	16	13	14	14	16
Isoäidit	13	10	21	6	12	16	14	14	15	18
Sukusiitosprosentti	1,48 %	3,63 %	1,47 %	0,13 %	3,36 %	3,03 %	2,93 %	2,01 %	1,09 %	2,86 %

Rekisteröintimäärät Suomessa

Suomessa syntyneitä venäjänvinttikoiria on rekisteröity tarkasteluajanjaksolla yhteensä 404 kpl. Rekisteröintimäärissä vuosien välillä on jonkin verran vaihtelua, mutta vuosittain syntyneiden pentueiden lukumäärä on asettunut tasolle 7–10. Tuontikoiria tuodaan Suomeen kiitettävä määrä vuosittain, mutta suurinta osaa ei käytetä jalostukseen. Vuosina 2016–2025 tuontikoiria rekisteröitiin yhteensä 142, joista uroksia oli 67 ja narttuja oli 75. Alle kaksivuotiaita rekisteröidyistä tuontikoirista oli 16. Tarkempia syitä tuontikoirien pois jättämiseen jalostuksesta ei voida sanoa tilastojen valossa.

Rodun jalostusurosten ja -narttujen ikä

Jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen ikä on laskenut hieman vuosien 2016–2025 välillä. Tarkastelujaksolla keskimäärin jalostukseen on käytetty 4 v 7 kk ikäisiä uroksia ja 5 v 4 kk ikäisiä narttuja, mikä on koirilla kohtuullisen korkea jalostusikä, varsinkin kun suurimmalla osalla jalostukseen käytetyistä koirista on vain yksi pentue tarkastelujaksolla.

Rodun vuosittainen sukusiitosaste

Vuosien 2016–2025 välillä rodussa tehtävien pentujen keskimääräinen sukusiitosaste on laskenut hieman, mutta vaihtelua vuosien välillä on runsaasti. Koiranetin laskelma ei kerro kuinka monella sukupolvella sukusiitosaste on laskettu ja kuinka paljon pentueiden välillä on vaihtelua tunnettujen sukupolvien määrässä. Laskeva suunta sukusiitoksessa, viittaa vahvasti siihen, että sukutauludata SKL:n järjestelmässä on liian vaillinaisen sukusiitosasteen kehityksen arviointiin populaatiotasolla. Suljetuissa populaatioissa, kuten koirarodut, keskimääräinen sukusiitosaste yleensä kasvaa, koska suljettuun populaatioon ei voi tulla uutta perinnöllistä vaihtelua rodun ulkopuolelta ja populaatiossa sukusiitos alkaa väistämättä kasvamaan ajan kuluessa. Venäjänvinttikoiria ei ole kotimainen rotu, joten kannassa vaikuttavat tuontikoirat, joiden sukuja ei ole lisätty kokonaisuudessaan SKL:n tietokantaan. Pentueiden sukusiitos on pysynyt kuitenkin reilusti alle Suomen Kennelliiton asettaman 6,25 %:n maksimirajan.

4.1.2 Jalostuspohja

Rodun tehollinen populaatiokoko

Jalostuskoirien määrälliseen laskentakaavaan pohjautuva tehollinen populaatiokoko rodulla on keskimäärin tarkastelujaksolla 37,3 (60,4 %), mikä viittaa siihen, että rotu on riippuvainen tuontikoirien

jalostuskäytöstä. Tarkastelujaksossa rodun tehollinen populaatiokoko on hieman laskenut. Tehollisen koon perusteella suomalainen populaatio rodulle ei ole omavarainen eikä tule selviytymään pitemmällä aikavälillä ilman merkkejä sukusiitostaantumasta ilman jatkuvia ulkomaantuonteja. Tulee kuitenkin huomioida, että käytetty laskukaava ei ota huomioon koirien välisiä sukulaisuuksia ja antaa näin ollen todennäköisesti yliarvion rodun todellisesta tehollisesta populaatiokoosta. Ihanteellisempi tapa olisi arvioida rodun tehollista populaatiokokoa perustuen keskimääräisen sukusiitosasteen nousuun per sukupolvi.

Taulukko 2. Jalostuspohja – Vuosina 2016–2025 syntyneet pentueet

Lähde: Jalostustietojärjestelmä (30.3.2026)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Per vuosi										
- pentueet	8	5	9	5	6	10	6	7	9	11
- jalostukseen käytetyt eri urokset	8	5	9	5	6	8	6	7	8	11
- jalostukseen käytetyt eri nartut	8	5	9	5	6	10	6	7	9	11
- isät/emät	1	1	1	1	1	0,8	1	1	0,89	1
- tehollinen populaatio	11 (69%)	7 (70%)	12 (67%)	7 (70%)	8 (67%)	12 (60%)	8 (67%)	9 (64%)	12 (67%)	15 (68%)
- uroksista käytetty jalostukseen	0 %	0 %	6 %	6 %	4 %	22 %	14 %	19 %	19 %	11 %
- nartuista käytetty jalostukseen	0 %	7 %	5 %	20 %	10 %	12 %	30 %	35 %	9 %	24 %
Per sukupolvi (4 vuotta)										
- pentueet	27	25	30	27	29	32	33	30	37	39
- jalostukseen käytetyt eri urokset	27	24	26	25	26	26	26	24	33	36
- jalostukseen käytetyt eri nartut	25	24	29	26	28	29	28	28	33	36
- isät/emät	1,08	1	0,9	0,96	0,93	0,9	0,93	0,86	1	1
- tehollinen populaatio	34 (63%)	32 (64%)	37 (62%)	34 (63%)	36 (62%)	37 (58%)	36 (55%)	35 (58%)	44 (59%)	48 (62%)
- uroksista käytetty jalostukseen	3 %	4 %	10 %	12 %	15 %	18 %	16 %	18 %	15 %	11 %
- nartuista käytetty jalostukseen	6 %	8 %	9 %	16 %	19 %	20 %	23 %	22 %	16 %	17 %

Jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen osuus syntyneistä

Koska venäjänvinttikoirilla keskimääräinen jalostuskäytön ikä on korkea, jalostukseen käytettyjen koirien osuutta ei voida arvioida luotettavasti tilastojen tuoreimmasta päästä, koska moni viime vuosien aikana syntynyt koira ei ole vielä jalostuskäytössä ikänsä ja tulostensa puolesta. Prosentuaalisissa osuuksissa on vuosien välillä paljon vaihtelua, mutta keskimäärin jalostukseen on käytetty uroksista noin 12 % ja nartuista 16 % jos tarkastellaan vuosia 2016–2025.

Isät/emät -luku

Rodun isä/emä -luku on keskimääräisesti tarkastelujaksolla hyvin lähellä 1, mikä kertoo siitä, että suomalaisessa kasvatustyössä keskitytään käyttämään jalostuskoiria mahdollisimman laajasti jalostukseen. Tämä ei kuitenkaan kerro sitä, kuinka läheistä sukua jalostukseen käytetyt yksilöt mahdollisesti ovat.

Taulukko 3. Viimeisen 10 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 20 urosta

Lähde: Jalostustietojärjestelmä (30.3.2026)

#	Uros	Syntymä- vuosi	Tilastointiaikana				Toisessa polvessa		Yhteensä	
			Pentueita	Pentuja	%-osuus	kumulat.%	Pentueita	Pentuja	Pentueita	Pentuja
1	ISCHYMA TRISTAN	2011	2	16	3,96 %	4 %	0	0	2	16
2	BOLSHAJAN FINARFIN	2012	2	13	3,22 %	7 %	1	1	2	13
3	ZATRAVIN KRASNIK	2019	2	13	3,22 %	10 %	1	11	2	13
4	OF GOLDEN-WEST MORNING BLUES	2011	2	12	2,97 %	13 %	3	21	4	22
5	TAIGATASSUN CAPTAIN DRAKE	2018	2	12	2,97 %	16 %	0	0	2	12
6	TARASOV'S HOLD YOUR HORSES	2009	2	11	2,72 %	19 %	1	6	2	11
7	STARAJA RUSSA NAHAL	2014	2	11	2,72 %	22 %	1	2	2	11
8	RUSSKIY AZART CHALEYN ESSENTIAL MIRACLE AT YEGOROV	2015	1	11	2,72 %	25 %	0	0	1	11
9	DOROGOI VON ALSHAMINA	2016	2	10	2,48 %	27 %	0	0	2	10
10	PHAEDRA TAMELANE	2010	2	10	2,48 %	29 %	5	26	2	10
11	STAZCEK'S CURSE OF MILLHAVEN	2020	1	10	2,48 %	32 %	0	0	1	10
12	BORSCANA IMPRESSIVE	2021	1	10	2,48 %	34 %	0	0	1	10
13	LYNX AUTUMN FIRE	2017	1	10	2,48 %	37 %	2	20	1	10
14	ZIVANOVA'S EFIMER NEVSKIJ	2022	1	9	2,23 %	39 %	0	0	1	9
15	EUGENIAN TALENTED THOR	2022	1	9	2,23 %	41 %	0	0	1	9
16	YEGOROV SHADOW AND LIGHT	2017	1	9	2,23 %	44 %	2	6	1	9
17	BORSCANA REVELSTONE LEGACY	2021	1	8	1,98 %	46 %	0	0	2	19
18	CAPOLAVORO IVANHOE SYMPHONY OF GOLDEN-WES	2018	1	8	1,98 %	48 %	0	0	1	8
19	STEEPES CALIFORNIA FIRE AND RAIN	2017	1	8	1,98 %	50 %	4	16	1	8
20	ZIVANOVA'S DVOINOI NAGRAD	2020	1	8	1,98 %	51 %	1	9	1	8

19 urosta 62 käytetystä uroksesta on tuottanut 50 % ajanjakson pennuista.

Taulukko 4. Viimeisen 10 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 20 narttua

Lähde: Jalostustietojärjestelmä (30.3.2026)

#	Narttu	Syntymä- vuosi	Tilastointiaikana				Toisessa polvessa		Yhteensä	
			Pentueita	Pentuja	%-osuus		Pentueita	Pentuja	Pentueita	Pentuja
1	RAINMAKER NEVADA NIGHTFALL	2013	2	15	3,71 %		1	1	2	15
2	VASART SUDARUSHKA	2017	2	13	3,22 %		0	0	2	13
3	CAVALLIERIK TROPICANKA	2019	2	13	3,22 %		0	0	2	13
4	YEGOROV ISIS	2012	1	11	2,72 %		0	0	1	11
5	PHAEDRA UMA	2012	2	11	2,72 %		1	6	2	11
6	STAZCEK'S MY BEAUTIFUL LEAH	2018	1	10	2,48 %		0	0	1	10
7	EUGENIAN LADY LEIA	2018	1	10	2,48 %		1	9	1	10
8	YEGOROV DIVINE DELIGHT	2019	1	10	2,48 %		0	0	1	10
9	YEGOROV BRILLIANT MOONBEAM	2019	1	9	2,23 %		0	0	1	9
10	ZATRAVIN IRINJA	2016	2	9	2,23 %		0	0	2	9
11	GINWITHTONIC WEISS GELB ODER GRAU	2022	1	9	2,23 %		0	0	1	9
12	SUNBURST BARONWOOD'S ROYAL OF GOLDEN SYMPHONY	2012	1	9	2,23 %		2	13	1	9
13	ZATRAVIN GARINJA	2014	2	9	2,23 %		2	18	2	9
14	BOLSHAJAN GRAFINYA	2015	1	9	2,23 %		2	6	1	9
15	POLONGAIN OJAKOVA	2009	2	8	1,98 %		2	9	3	16
16	OF GOLDEN-WEST MIRACLE ROSE	2009	1	8	1,98 %		1	12	3	14
17	BETJANOVA ALMATY HARTYNOVNA	2009	1	8	1,98 %		0	0	1	8
18	OF GOLDEN-WEST FANTASY	2011	1	8	1,98 %		0	0	1	8
19	ZIVANOVA'S BYJENA MINKA	2011	1	8	1,98 %		1	6	1	8
20	YEGOROV LA BELLE ANGELE	2015	1	8	1,98 %		1	9	1	8

Jalostuskoirien käyttömäärät

Jalostukseen on käytetty niin uroksia kuin narttuja tasapuolisesti tarkastelujaksolla. Uroksilla ja nartuilla on ollut maksimissaan kaksi pentuetta ja pentujen lukumäärä on ollut 20 pentua per koira. Runsaimmin käytettyjen urosten kohdalla yhdellä uroksella oli 5 toisen polven pentuetta (26 pentua) ja yhdellä kolme. (21 pentua), mutta prosentuaalisesti syntyneistä toisen polven pennuista nämä olivat alle 10 %. Rodun taustalla on kuitenkin vanha pullonkaula missä tiettyjä uroksia on käytetty runsaasti jalostukseen, ennen tarkastelujaksoa ja niillä on paljon toisen polven jälkeläisiä. Eniten toisen polven

jälkeläisiä (13 % syntyneistä) oli uroksella KRILAT CHARADEI (21 pentuetta ja 41 pentua). Nartuilla toisen polven jälkeläisten määrät olivat tasaisempia.

Jalostuskoirien keskinäinen sukulaisuus

Perustuen SKL:n rotujärjestöaineistoon jalostukseen käytettyjen urosten keskimääräinen sukulaisuus tarkastelujaksolla (2016–2025) oli 2,2 % ja narttujen 2,6 %. Urosten ja narttujen välinen keskimääräinen sukulaisuus oli 1,7 %. Kun tarkasteltiin 19 eniten käytettyä urosta (jotka yhdessä muodostivat 50 % pentuekannasta), näiden urosten keskinäinen sukulaisuus oli 4,1 %, ja niiden sukulaisuus kaikkiin jalostusnarttuihin oli keskimäärin 1,8 %. On huomioitava, että tarkastelujaksolla uroksilla ja nartuilla oli enintään kaksi pentuetta ja suurimmalla osalla vain yksi. Yhdellä nartulla oli tarkastelujaksolla kolme pentuetta, mutta vain 7 pentua.

Sukulaisuusmatriisi osoittaa, että tarkastelujaksolla jalostukseen käytetyt koirat muodostavat muutamia selkeästi erottuvia suku- ja linjakokonaisuuksia. Selkeimmin esiin nousee YEGOROV-linja, jonka koiria on käytetty jalostukseen useissa peräkkäisissä sukupolvissa, ja pentueissa on ollut runsaasti sekä uros- että narttupuolisia sukua jatkavia yksilöitä. Syntyneistä pennuista YEGOROV-linjan koirat ovat toimineet 12,6 %:ssa eminä ja 6,9 %:ssa isinä. Toiseksi laaja kokonaisuus muodostuu STARAJA RUSSA- ja ZATRAVIN-suvuista, joiden välillä havaittiin korkeita keskinäisiä sukulaisuuksia. Näiden sukujen nartut ovat olleet eminä 6,9 % ja 6,4 % syntyneistä pennuista ja urokset isinä 5,7 % ja 4,9 %. Kolmanneksi laajin kokonaisuus oli BOLSHAJAN-linja, jonka nartut olivat eminä 4,7 % ja urokset isinä 6,7 % tarkastelujaksolla syntyneistä pennuista.

Nämä ryhmittymät kuvaavat, mitä sukuja ajanjaksolla on jalostuksessa käytetty eniten ja missä kohtaa populaation sisäinen sukulaisuus tiivistyy, vaikka varsinaisia sukusiitosriskiä aiheuttavia yhdistelmiä ei ole tehty. Tuloksia tarkasteltaessa on tärkeää huomioida, että SKL:n data on tuontikoirien osalta puutteellista. Sukutaulujen täydellisyysaste (pedigree completeness index, PCI) viidellä polvella oli uroksilla keskimäärin 0,85 ja nartuilla 0,89.

4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa

Venäjänvinttikoiralla on laajat jalostuspopulaatiot maailmanlaajuisesti, ja suurin niistä sijaitsee rodun kotimaassa Venäjällä. Tällä hetkellä Suomen Kennelliitto ei rekisteröi venäläisiä eikä valkovenäläisiä koiria, mikä sulkee näissä maissa syntyneet yksilöt pois suomalaisesta jalostuskäytöstä. Tämä rajoittaa merkittävästi rodun kansainvälistä geenipoolia. Vaikka venäläisiä sukulinjoja on aiemmin tuotu länsimaihin, Venäjällä on yhä jalostuslinjoja, jotka ovat harvinaisempia Venäjän ulkopuolella. Venäläisten koirien täydellinen poissulkeminen FCI-maiden jalostuksesta on populaatiogeneettisesti merkittävä uhka. Se jakaa rodun käytännössä kahteen jalostuspopulaatioon, jotka eivät pääse helposti vaihtamaan geneettistä materiaalia. Jos tämä eristys jatkuu pitkään, länsimaisen ja venäläisen borzoin välille voi kehittyä huomattavia geneettisiä eroja.

Rodun harrastajien ylläpitämän The Breed Archive/borzoi -tietokannan mukaan suurimmat populaatiot länsimaissa ovat Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa. Tietokantaan kirjataan vuosittain noin 1 500 uutta koiraa ympäri maailmaa. Koska kaikkia syntyneitä pentueita ei ilmoiteta järjestelmään, kannan tarkasta koosta ei kuitenkaan ole täsmällistä tietoa.

Tilastointi aikana Suomeen on eniten tuotu koiria Venäjältä (33 kpl), Ruotsista (20 kpl) ja Virossa (12 kpl). Jälkeläisiä eniten tuontikoirista oli uroksella DOROGOI VON ALSHAMINA (Saksa, 10 pentua ja kaksi pentuetta), nartuilla VASART SUDARUSHKA (Venäjä, 13 pentua ja kaksi pentuetta) ja CAVALLIERIK TROPICANKA (Venäjä, 13 pentua ja kaksi pentuetta). Näillä kolmella koiralla on samoja jalostuslinjoja takanaan ja niiden keskimääräinen sukulaisuus on noin 9–11 % välillä 10 sukupolvella laskettuna Borzoi

Breed Archivessa. Suurinta osaa tilastointi aikana tuoduista koirista ei ole käytetty rodun jalostukseen (81 %), mutta noin 20 % tuonneista on syntyneet vuoden 2022 jälkeen, joten osaa koirista tullaan mahdollisesti vielä käyttämään jalostukseen tulevinä vuosina.

4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostus pohjasta

Rodun jalostuspohjan laajuus

Suomalainen rodun alapopulaatio on tarkastelujaksolla ollut tasapainoisesti jalostettu ja urosten eikä narttujen liikkakäyttöä ei ole esiintynyt. Rotu on kuitenkin riippuvainen eri sukuisista tuontikoirista, jotta rodun pitkän aikavälin selviytyminen on turvattu. Rekisteröintimäärät ovat menneet tarkastelujaksolla alaspäin ja syitä tähän olisi hyvä selvittää.

Tärkeimmät jalostuspohjaa kaventavat tekijät

Suomalainen rodun kanta pienenee koko ajan ja uhkana on pienen kannan sukulaistuminen. Euroopasta ja Yhdysvalloista on mahdollista saada uusia linjoja tuontien myötä, mutta rodun alkuperämaasta (Venäjä) ei tällä hetkellä voida tuoda lainkaan koiria jalostuskäyttöön. Tämä kaventaa rodun jalostuspohjaa, koska uusia linjoja Suomen kantaan nähden ei voida tuoda Venäjältä. Tulevaisuuden uhkana on rodun vahva eriytyminen rodun venäläisestä populaatiosta.

Jälkeläismäärään perustuva PEVISA-ohjelma

Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa.

4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun käyttötarkoituksesta

Käyttötarkoitus: Metsästävä vinttikoiri, rata- ja maastajuoksija. Käytetään pääasiassa jäniksen ja ketun, harvemmin suden metsästyksen. Siinä yhdistyy suuri ketteryys kestävyys ja kykyyn kaataa riistä nopeasti. Käytetään menestyksellisesti myös rata- ja maastajuoksukokeissa.

Käyttäytyminen/luonne: Rauhallinen. Näköhavaintoihin perustuvat reaktiot ovat voimakkaita. Koiri liikkuu verkkaista ravia tai jopa käyntiä ennen kuin on havainnut riistan, täyttä laukkaa riistaa ajaessaan. Suhtautuminen ihmisiä kohtaan välinpitämätön tai ystävällinen.

Hylkäävät virheet: Vihaisuus tai liiallinen arkuus, selvästi epänormaali käyttäytyminen.

4.2.2 Jakautuminen näyttely- / käyttö- / tms. -linjoihin

Suomalaisessa jalostuksessa tulisi pyrkiä siihen, että borzoi kykenee osoittamaan kykynsä käyttöpuolella kuin näyttelyissä. Suomen borzoipopulaatiossa on hienosti siihen kykeneviä koiria. Vaikka rotu ei ole selkeästi jakautunut käyttö- ja näyttelylinjoihin, niin osa harrastaja kunnasta on selvästi jakautunut vahvasti vain toisen harrastusmuodon puolelle. Tämä on jalostuksen kannalta riskitekijä, koska se voi ohjata kasvattajia tekemään jalostusvalintoja harrastajakunnan mielenkiinnon kohteen mukaan, jolloin rotu voi alkaa pikkuhiljaa eriytymään näyttely- ja käyttölinjoihin.

Suomen Borzoiklubi kannustaa kasvattajia testaamaan jalostuskoiransa näyttelyiden lisäksi myös käyttökokeissa, ainakin hyväksytty käyttötulos olisi toivottava. Maasto-, ajue- ja ratakokeissa pyritään testaamaan koirien nopeutta, vauhtikestävyyttä, ketteryyttä ja ajoviettiä. Pentuvälityspalstalla julkaistaan terveys- ja näyttelytulosten lisäksi myös pentueen vanhempien mahdolliset käyttökokeet.

4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai käyttööminäisyyksien testaus ja/tai kuvaus

Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa. Rodulle on vahvistettu käyttäytymisen jalostustarkastuksen ihanneprofiili, ja ensimmäinen ihanneprofiilin mukaisen tarkastus on järjestetty 2025. Testaus ei kuitenkaan ole edellytys pentueen rekisteröinnille.

4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa

Venäjänvinttikoiraa on pidettyväinen vieraita ihmisiä kohtaan, jopa välinpitämätön. Kennelliiton terveyskyselyn, näyttelyarvosteluiden ja käyttökoetulosten perusteella aggressiivisuutta ihmisiä kohtaan ei ole havaittavissa, mutta Koiranetin kuolinsyytilastoon on ilmoitettu, että 16 (1,8 %) venäjänvinttikoiraa on lopetettu käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi, joista viidellä on ollut syynä viihaisuus ja neljällä salakavaluus tai arvaamattomuus. Neljällä ei ole eriteltyä syytä. Keski-ikä käyttöongelmien vuoksi lopetetuilla on vajaa 4 v. 8 kk. Arkuutta ja aggressiivisuutta vieraita koiria kohtaan on jonkin verran havaittavissa.

Luonnekysely

Suomen Kennelliiton terveyskyselyn luonnekysymyksiin vastanneiden (91) mukaan suurin osa rodun yksilöistä (90,1 %) ei osoittanut lainkaan käyttäytymisongelmia. Raportoituja käyttäytymisen ongelmia olivat arkuus tai pelko (4,4 %), vihamielisyys muita koiria kohtaan (2,2 %), sekä jokin muu poikkeava käytös (4,4 %). Kyselyn tulokset tukevat rodun tasapainoista ja rodunomaisen luonteenomaista käyttäytymistä, ja käyttäytymisen ongelmat esiintyvät pääasiassa yksittäistapauksina.

Luonnetesti ja MH-luonnekuvaus

Virallisessa kennelliiton luonnetestissä on käynyt 26 borzoita vuosien 2016–2025 aikana. MH-luonnekuvaus on käynyt kolme borzoita vuosien 2016–2025 välillä.

Taulukko 5: Luonnetestien osallistumismäärät

Lähde: Jalostustietojärjestelmä 19.1.2026

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
LTE		2 koiraa			1 koiraa		8 koiraa	11 koiraa	1 koiraa	
LTE0										
LTE-		1 koiraa		1 koiraa			1 koiraa			
Yhteensä	0 koiraa	3 koiraa	0 koiraa	1 koiraa	1 koiraa	0 koiraa	9 koiraa	11 koiraa	1 koiraa	0 koiraa

Taulukko 6: Luonnetestien arvioidut ominaisuudet kootusti

Lähde: Jalostustietojärjestelmä 19.1.2026

Arvioitu ominaisuus	+3	+2	+2a	+2b	+1	+1a	+1b	-1	-1a	-1b	-1c	-2	-2a	-2b	-3
Toimintakyky		1				5	8	9							
Terävyys	1					2	20								
Puolustushalu	1				11			11							
Taisteluhalu			2	4				12				5			
Hermorakenne		2				13	7	1							
Temperamentti	1	20	2												
Kovuus					21							2			
Luoksepäästävyys	12		10	1											

Laukauspelottomuus	+++	++	+	-	--	---
	13	8		2		

Kennelliiton luonnetesti on antaa tärkeää tietoa venäjänvinttikoiran hermorakenteesta, temperamentista, luoksepäästävyydestä, taipumuksista aggressiivisiin reaktioihin ja laukauksien sietämisestä. Testiin osallistuneiden koirien luonteiden voidaan sanoa olevan rodulle tyypillisesti hieman rauhaton, havaintokykyään hyvin käyttävä, nopeasti reagoiva. Venäjänvinttikoiraa on alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan metsästyskoira, jonka metsästystapa perustuu viettiin ja itsenäiseen työskentelyyn.

Taulukko 7: MH-luonnekuvauksen osallistumismäärät

Lähde: Jalostustietojärjestelmä 19.1.2026

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
suoritettu				1 koiraa						1 koiraa
ohj. kesk.										1 koiraa
kuv. kesk.										
Yhteensä	0 koiraa	0 koiraa	0 koiraa	1 koiraa	0 koiraa	0 koiraa	0 koiraa	0 koiraa	0 koiraa	2 koiraa

Kennelliiton luonnetestin ja MH-luonnekuvauksen perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä niistä koirista, joista on tuloksia. Jalostustarkastuksien yhteydessä tehtyjä luonnearviointeja on tilastoanalyysiä ajatellen liian vähän, mutta yleisesti niiden tulokset vastaavat rotumääritelmän luonnekuvausta. Näyttelyiden yhteydessä ulkomuototuomarien arviot osallistuneista koirista lähes poikkeuksetta tukevat käsitystä, että rodun yksilöt käyttäytyvät rodunomaisesti.

Jalostustarkastus

Venäjänvinttikoiralle on hyväksytty käyttäytymisen jalostustarkastuksen ihanneprofiili. Rodun ensimmäinen käyttäytymisen jalostustarkastus järjestettiin vuonna 2025. Tarkastukseen osallistui 13 koiraa, joista 12 hyväksyttiin ja yksi sai hylätyn.

Taulukko 8: Käyttäytymisen jalostustarkastukseen osallistumismäärät

Lähde: Jalostustoimikunnan tilasto

	2025
hyväksytty	12 koiraa
hylätty	1 koiraa

Tarkastukseen osallistuneet koirat olivat pääosin luonteeltaan rodulle tyypillisiä. Suurin osa koirista suhtautui neutraalisti tai hieman pidättyvästi vieraisiin ihmisiin ja uusiin tilanteisiin, mutta palautui tilanteista hyvin. Kohtalainen itsenäisyys ja ympäristön tarkkailu olivat monilla koirilla havaittavissa, mikä on rodulle tyypillistä.

Tulosten perusteella rodun käyttäytymisen ihanneprofiili vastasi pääosin rodusta yleisesti kuvattua luonnetta: koirat olivat rauhallisia, melko pidättyväisiä vieraita kohtaan mutta hallittavissa olevia ja yhteistyökykyisiä omistajansa kanssa. Ensimmäinen tarkastus antoi alustavaa tietoa rodun käyttäytymisominaisuuksista, mutta laajempien johtopäätösten tekeminen edellyttää jatkossa suurempaa aineistoa.

Näyttelyt

Näyttelyarvosteluissa luonnetta kuvataan usein rauhalliseksi, arvokkaaksi ja tasapainoiseksi. Suurin osa koirista esiintyy näyttelytilanteessa rodulle tyypillisesti hillitysti ja hallitusti. Rodulle ominainen pidättyväisyys vieraita kohtaan näkyy joissakin yksilöissä varautuneisuutena tuomaria tai käsittelyä kohtaan, mutta tämä on useimmiten luonteeltaan neutraalia eikä liity aggressiiviseen käyttäytymiseen.

Näyttelytilanteiden perusteella rodun yksilöt sopeutuvat yleensä hyvin vilkkaaseen ja häiriöitä

sisältävään ympäristöön. Koirat ovat pääosin käsiteltävissä normaalisti tuomarin tarkastuksessa, ja selvästi arkoja tai aggressiivisia yksilöitä esiintyy harvoin. On kuitenkin huomioitava, että näyttelyt eivät ole varsinaisia käyttäytymisen testausympäristöjä, minkä vuoksi niistä saatava tieto rodun luonneominaisuuksista on rajallista.

Näyttelyarvosteluissa luonnetta koskevia huomautuksia on tullut muutamia. Ilmoituksia aggressiivisuudesta kennelliittoon ei ole tehty kuin yksi. Huomautuksia luonteesta ovat saaneet yleisemmin nuoret koirat, jotka väistävät tuomaria. Arvosteluista on löydetty yksi tapaus, missä koira on hylätty näyttelyssä aggressiivisuuden vuoksi. Vuonna 2024 on kaksi tapausta ja vuonna 2025 yksi, joissa koira on koittanut purra. Jokainen tapaus on turha, mutta suhteutettuna kokonaiskäyntimäärään (7 136 kpl) määrä on kuitenkin vähäinen.

Taulukko 9: Vuosina 2016–2025 EVA- ja HYL tuloksen saaneet koiranäyttelyissä

Lähde: Rotujärjestöaineisto 2016–2025

	EVA	HYL
Junioriluokka	11	11
Nuortenluokka	5	1
Avoinluokka	11	24
Käyttöluokka	2	
Valioluokka	7	4
Veteraaniluokka	7	2
Yhteensä	43	42

Erot eri maiden populaatioiden välillä

Venäjänvinttikoiran populaatioissa eri maissa esiintyy jonkin verran eroja sekä rakenteessa, tyypissä että luonneominaisuuksissa. Erot johtuvat pääasiassa jalostuksen historiallisista painotuksista, kuten käyttöominaisuuksien, näyttelytyypin tai seurakoiruominaisuuksien korostamisesta. Kansainvälinen jalostusyhteistyö sekä koirien tuonnit eri maista ovat kuitenkin tasoittaneet populaatioiden välisiä eroja viime vuosikymmeninä.

Rodun alkuperämaassa Venäjällä sekä joissakin muissa Itä-Euroopan maissa borzoi on historiallisesti säilynyt lähempänä alkuperäistä käyttötarkoitustaan metsästyskoirana. Näissä populaatioissa jalostuksessa on perinteisesti arvostettu kestävyyttä, toiminnallista rakennetta sekä metsästysominaisuuksia. Tämä voi näkyä joissakin linjoissa hieman voimakkaampana saalisviettinä, toimintakykyisenä rakenteena sekä ajoittain myös itsenäisempänä luonteena.

Monissa Keski-Euroopan maissa venäjänvinttikoiria kuvataan yleensä tasapainoisiksi, rauhallisiksi ja hyvin seurakoiriksi soveltuviksi. Käyttöominaisuudet ovat kuitenkin säilyneet tästä huolimatta.

Pohjoismaisessa populaatiossa on vaikutteita sekä Keski-Euroopan että Venäjän linjoista, mikä on lisännyt geneettistä monimuotoisuutta. Luonteeltaan koirat kuvataan usein rauhallisiksi, hieman pidättyväisiksi vieraita kohtaan mutta läheisiin ihmisiin kiintyviksi. Jalostuksessa pyritään yleisesti tasapainoon rakenteen, terveyden ja luonteen välillä.

Yhdysvallat ja Kanada muodostavat laajan ja osittain omaleimaisen populaation. Jalostuksessa on painotettu sekä näyttelymenestystä että harrastusominaisuuksia. Populaatio on geneettisesti suhteellisen laaja, ja siihen on tuotu vaikutteita useista eurooppalaisista linjoista. Rakenteessa ja tyypissä voi esiintyä jonkin verran vaihtelua, mutta rodun perusominaisuudet ja luonne ovat säilyneet samankaltaisina kuin muissa populaatioissa.

Sukupuolten väliset erot

Venäjänvinttikoirilla urosten ja narttujen väliset erot luonteessa ja käyttäytymisessä ovat yleisesti ottaen vähäisiä, ja yksilöiden välinen vaihtelu on usein suurempaa kuin sukupuolten välinen ero. Kokemusten perusteella uroksia pidetään toisinaan avoimempia ja sosiaalisempia, kun taas nartut voivat olla hieman itsenäisempiä ja ympäristöään tarkkailevampia. Joillakin uroksilla voi esiintyä kilpailullisuutta muita uroksia kohtaan, ja narttujen käyttäytymiseen voi ajoittain vaikuttaa lisääntymiskierto. Rodun luonteen peruspiirteet ovat kuitenkin pääosin samankaltaiset molemmilla sukupuolilla.

4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet

Rodun alkuperäinen käyttö

Rotumääritelmän mukaan venäjänvinttikoiran käyttötarkoitus on metsästävä vinttikoiria, rata- ja maastajuoksukoiria. Rodun alkuperämaassa Venäjällä venäjänvinttikoiria käytetään edelleen aktiivisesti perinteiseen tapaan jäniksen ja ketun metsästykseseen. Venäjällä rodun koirat voivat osallistua myös metsästyskokeeseen. Venäjänvinttikoirat metsästävät tyypillisesti ajueina, joissa on 2–4 koiraa. Kullakin koiralla on ajossa oma roolinsa, mutta ajon aikana koirat vaihtavat roolia tarpeen mukaan. Roolin vaihteluiden ja metsästämisstrategian hallinnan lisäksi koirien tulee olla fyysisesti ja rakenteellisesti kykeneviä riistaeläimen seuraamiseen erilaisissa maastoissa.

Käyttöominaisuuksien säilyttäminen

Venäjänvinttikoiralla on vahva metsästysvietti, mutta vinttikoiralle tyypillinen metsästys ei ole sallittua Suomessa. Vinttikoiraa on kuitenkin luvallista käyttää metsästykseseen, edellyttäen että metsästäjä on suorittanut metsästäjäutututkimuksen, hänellä on voimassa oleva aseenkantolupa ja että vinttikoiria ei tapeta vaan saalis tapetaan ampumalla. Venäjänvinttikoiria ei kuitenkaan tiettävästi käytetä Suomessa metsästykseseen eikä niillä ole Suomessa mahdollisuutta metsästyskokeeseen. Käyttöominaisuuksia pyritään testaamaan ja säilyttämään järjestämällä maasto-, ajue- ja ratajuoksukokeita.

Vinttikoirakokeista koira voi tulla kansainväliseksi käyttövalioksi (C.I.C), kansainväliseksi kaksoisvalioksi (C.I.B.P = kansainvälinen muoto- ja käyttövalio), sekä Suomen käyttövalioksi (KVA-VIR = ratajuoksu, KVA-VIC = maastajuoksu tai ajuejuoksu = KVA-VICA).

Venäjänvinttikoirat osallistuvat aktiivisesti maastajuoksukokeisiin mutta vähemmän ratajuoksu- sekä ajuekokeisiin. Ratajuoksukokeella voidaan testata ainoastaan koiran nopeutta ja metsästysviettä. Jos koira juoksee innokkaasti viehettä saalistaen, on sillä vahva metsästysvietti. Sen sijaan ei voida vetää johtopäätöstä toisin päin. Koiralla voi olla vahva metsästysvietti ja se voi saalistaa elävää riistaa olematta kiinnostunut vieheestä varsinkaan radalla, jossa viehe ei tee yllättäviä liikkeitä. Ajuekoe vastaa parhaiten aitoa metsästystilannetta varsinkin venäjänvinttikoiralla. Koirat juoksevat omistajan tai omistajien ilmoittamana ryhmänä, jota kutsutaan ajueeksi. Ajue koostuu 3 koirasta, jotka voivat olla myös keskenään erirotuisia.

Koirat voivat osallistua rata-, ajue- ja maastajuoksukokeisiin 1,5-vuotiaasta sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana se täyttää kahdeksan vuotta. Venäjänvinttikoirien käyttöominaisuudet tulee säilyttää. SBK pyrkii kannustamaan vinttikoirakokeisiin osallistumista. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni rekisteröidystä koirasta osallistuisi vinttikoirakokeisiin.

Vertailu rodun kotimaahan ja muihin tärkeisiin maihin

Venäjänvinttikoiran alkuperäinen käyttötarkoitus metsästyskoirana näkyy yhä rodun kotimaassa Venäjällä ja joissakin Itä-Euroopan populaatioissa. Näissä linjoissa koirat osoittavat tyypillisesti vahvaa saalisviettä, ketteryyttä ja itsenäistä työskentelykykyä. Alkuperäisten metsästyskokeiden lisäksi maasto- ja ratajuoksu ovat suosittuja koemuotoja.

Keski- ja Länsi-Euroopan populaatioissa, jalostus on pitkälti keskittynyt näyttelytyyppiin mutta juoksulajien harrastusta löytyy hyvin. Tämän seurauksena käyttöominaisuudet voivat olla lievempiä, mutta koirat ovat säilyttäneet rodunomaisen ketteryden ja liikkuvuuden.

Pohjoismaissa populaatiot ovat kansainvälisen jalostusyhteistyön seurauksena monipuolisia. Rodun ominaisuudet ovat yhdistelmä rodun kotimaan metsästysominaisuuksia ja näyttelylinjojen tasapainoisuutta. Rodun harrastus- ja koeominaisuudet ovat mainiot.

Yhdysvalloissa käyttö- ja koeominaisuuksien painotus vaihtelee linjoittain. Populaatiossa on sekä näyttely- että juokсутyyppiä. Rotu soveltuu hyvin vinttikoirille suunnattuihin harrastusmuotoihin.

Kaikissa populaatioissa venäjänvinttikoiria säilyttää rodunomaisen ketteryden, saalisvietin ja itsenäisen työskentelykyvyn mutta jalostuksen painotukset eri maissa vaikuttavat käyttö- ja koeominaisuuksien korostumiseen. Rodun kotimaassa metsästysominaisuudet ovat vahvimmat, kun taas Euroopassa, Amerikassa ja Pohjoismaissa korostuvat näyttely- ja harrastusominaisuudet.

Kokeet

Taulukko 10a. Maastajuoksupökeisiin osallistuneet koirat vuosina 2021–2025

Lähde: Suomen Vinttikoiraliiton kilpailutietojärjestelmä

	2021	2022	2023	2024	2025
Koiria kokeissa	47	63	38	43	39
Startit (ae + fin)	218	197	165	148	171
Disk	13	7	5	5	3
Suljettu	0	1	0	1	1
Luopui	9	4	2	2	0
Keskeytetty	0	0	2	2	1
Loukkaantui	1	2	5	5	4
SERTK	30	34	8	13	19

Taulukko 10b. Ratajuoksupökeisiin osallistuneet koirat vuosina 2021–2025

Lähde: Suomen Vinttikoiraliiton kilpailutietojärjestelmä

Starttimäärät / matka	2021	2022	2023	2024	2025
280m	2	3	6	8	20
350m	0	0	0	0	2
480m	9	16	30	12	21

Koirat / matka	2021	2022	2023	2024	2025
280m	2	3	3	6	10
350m	0	0	0	0	2
480m	6	5	7	5	8

Suorituksia	2021	2022	2023	2024	2025
KV-aikoja	2	6	14	1	1
Kesk	2	1	3	2	1
Disk	1	2	1	5	3
Yhteensä koiria juoksi	8	8	7	9	12

Taulukko 10c. Ajuekokeisiin osallistuneet koirat vuosina 2021–2025*Lähde: Suomen Vinttikoiraliiton kilpailutietojärjestelmä*

	2021	2022	2023	2024	2025
Koiria kokeissa	9	10	3	0	7
Startit (ae + fin)	12	21	6	0	17
Mitätöity	0	0	0	0	1
Suljettu	0	1	0	0	0
Luopui	0	2	0	0	0
Keskeytetty	0	2	1	0	0
Loukkaantui	0	0	1	0	0
SERTK	0	0	0	0	0

Suomen käyttövalioksi maastajuoksukokeista valioitui vuosina 2016–2025 yhteensä 24 ja ratajuoksukokeista viisi borzoita, ajuekokeista ei ole valioituneita. Kansainvälisen käyttövalionarvon (C.I.C.) saavutti yksi ja kansainvälisen käyttö- ja muotovalionarvon (C.I.B.P.) kolme borzoita.

Taulukko 10d. Käyttövalion arvon saavuttaneet koirat vuosina 2016–2025*Lähde: Jalostustietojärjestelmä*

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
C.I.B.P.	1					1		1	1
C.I.C.					1				
FI KVA-VIC (M)	4	2	2	5	1	4	5		1
FI KVA-VIR (R)	1			1				2	1

Hyötykoira-, virka- tai muu työkäyttö

Venäjänvinttikoiria ei käytetä hyöty-, virka-, tai muussa työkoira käytössä.

Alkuperäiset, rodunomaiset käyttäytymistarpeet ja niiden täyttäminen

Venäjänvinttikoiria on alun perin jalostettu näöllään ajavaksi metsästyskoiraksi. Vinttikoirien juoksukilpailut edellyttävät saalistus- ja juoksuominaisuuksia, mutta eivät täysin vastaa alkuperäistä metsästystä keinotekoisuuden vuoksi.

4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen**Yksinoloon liittyvät ongelmat**

Rodussa esiintyy yksittäisiä tapauksia, joissa koirilla ilmenee yksinoloon liittyviä ongelmia, mutta kuitenkin se ei kyselyjen mukaan ole hälyttävän yleistä. Oireet voivat ilmetä esimerkiksi haukkumisena tai ulvomisena, levottomana liikkumisena, tavaroiden rikkomisena tai yrityksenä poistua tilasta koiran jäädessä yksin. Useimmissa tapauksissa ongelmat liittyvät puutteelliseen totuttamiseen yksinoloon tai koiran kokemaan stressiin yksin jäämisen yhteydessä. Yksinoloon liittyvät ongelmat ovat monitekijäisiä ja niihin vaikuttavat sekä perinnölliset että ympäristötekijät. Pennun varhaiset kokemukset, sosiaalistaminen sekä omistajan toteuttama yksinoloon totuttaminen vaikuttavat merkittävästi siihen, miten koira sopeutuu yksin olemiseen.

Lisääntymiskäyttäytyminen

Rodun lisääntymiskäyttäytyminen on luonnollista. Suurin osa venäjänvinttikoirien kotimaisista astutuksista on luonnollisia. Yleensä astutukset ja synnytykset sujuvat hyvin ja emät hoitavat pentunsa hyvin. Rodulla ei ole rotuominaisuutena rakenteellisia tai terveydellisiä seikkoja, jotka voivat vaikuttaa koirien lisääntymiskäyttäytymiseen. Tulevaisuudessa tulee kuitenkin erityisesti kiinnittää huomiota

urosten kykyyn luonnolliseen astumiseen sekä narttujen halukkuuteen antaa astua. Narttujen kiimaväli vaihtelee 6–9 kk. Imettämisaika 5–8 vk. Nartuilla on hyvä hoivavaisto ja ne suhtautuvat ihmiseen ystävällisesti pennuista huolimatta.

Sosiaalinen käyttäytyminen

Venäjänvinttikoirilla on yleisesti ottaen sosiaalinen luonne. Rodulla on taipumusta reagoida epäluuloisesti vieraisiin koiriin, tämä ominaisuus liittyy näiden yksilöiden lievään arkuuteen. Aikuisen koiran käyttäytymiseen vaikuttavat oleellisesti sen pentuaikaiset kokemukset ja kasvatus. Venäjänvinttikoiria on kookas, pitkäraajainen, voimakas, nopeasti reagoiva rotu, mitkä ominaisuudet taluttajan/käsittelijän tulisi huomioida.

Pelot ja ääniherkkyys

Ääniherkkyys ei ole rodulle tyypillistä, mutta rodussa esiintyy yksilöitä, joilla ilmenee pelokkuutta tai korostunutta reagointia äkillisiin ääniin. Ääniherkkyys voi ilmetä esimerkiksi säpsähtämisenä, välttelevänä käyttäytymisenä tai voimakkaana pakenemisreaktiona muun muassa laukausten, iltotulituksen tai muiden kovien äänien takia. Joillakin ääniherkkyys voi liittyä myös yleisempään epävarmuuteen uusissa tai yllättävissä tilanteissa.

Ikään liittyvät käytöshäiriöt

Monilla nuorilla koirilla on noin vuoden iässä ns. mörkökausi, jolloin ne saattavat alkaa pelätä todellisia tai kuviteltuja asioita. Tällöin koira saattaa myös yllättäen väistää vieraita ihmisiä, esim. tuomaria näyttelykehässä. Vaihe menee yleensä itsestään ohi. Vanhemmilla koirilla voi ilmetä vanhuuden tuomaa höperryttä, joka voi ilmetä muun muassa jonkinlaisena dementiana.

Rakenteelliset tai terveydelliset seikat, jotka voivat vaikuttaa koirien käyttäytymiseen

Yleisellä tasolla rodussa ei ole tunnistettu sellaisia rakenteellisia erityispiirteitä, joiden tiedettäisiin suoraan altistavan käyttäytymisongelmille. Kasvuikäisten koirien nopea kasvu sekä mahdolliset rasitusperäiset vaivat voivat tilapäisesti vaikuttaa koiran aktiivisuuteen ja reagointiin ympäristön ärsykkeisiin. Nuorten koirien kehitysvaihe on hyvä huomioida yksilöllisesti mm. liikuntamäärän ja liikuntamuotojen valinnassa. Nartuilla valeraskausoireet saattavat tehdä niistä haluttomia, laiskoja ja hieman masentuneita juoksuajan jälkeen. Harrastustoiminnassa valeraskausoireet on hyvä ottaa huomioon ja pitää tarvittaessa niistä taukoa.

4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista sekä niiden korjaamisesta

Venäjänvinttikoiralla luonne on yleisesti ottaen tasapainoinen ja rodulle tyypillinen. Rodun yksilöt ovat useimmiten rauhallisia, itsenäisiä ja hieman pidättyväisiä vieraita kohtaan, mutta kiintyvät läheisesti omiin ihmisiinsä. Vakavat käyttäytymisongelmat, kuten aggressiivisuus ihmisiä kohtaan, ovat rodussa harvinaisia.

Keskeisimmät luonteeseen liittyvät haasteet liittyvät joissakin yksilöissä liialliseen arkuuteen tai epävarmuuteen uusissa tilanteissa. Lisäksi rodulle tyypillinen pidättyväisyys voi joissakin tapauksissa korostua siten, että koira reagoi voimakkaasti vieraaseen ympäristöön tai käsittelytilanteisiin. Rodun voimakas saalisvietti voi myös vaikuttaa käyttäytymiseen erityisesti vapaana liikuttaessa.

Luonneominaisuuksien kehittämisessä keskeistä on kiinnittää jalostuksessa huomiota tasapainoiseen hermorakenteeseen sekä rodunomaiseen, mutta toimintakykyiseen käyttäytymiseen. Jalostusvalinnoissa tulisi välttää arkojen, selvästi epävarmojen tai aggressiivisten yksilöiden käyttöä. Lisäksi pentujen varhainen ja monipuolinen sosiaalistaminen sekä asianmukainen koulutus tukevat rodulle tyypillisen tasapainoisen käyttäytymisen säilymistä.

4.3. Terveys ja lisääntyminen

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet ja viat

Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa.

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet ja viat

Käytettävissä olevan seurantatiedon (terveystutkimukset, kuolinsyytilastot, kyselyt) perusteella venäjänvinttikoirilla esiintyy eräitä vakavia sairauksia, joiden tiedetään tai epäillään olevan periytyviä tai ainakin taipumus niihin periytyä. Näitä ovat esim. sydänsairaudet kuten sydäntä laajentava lihassairaus eli dilatoiva kardiomyopatia, mahalaukun laajeneminen ja kiertymä (GDV), luusyöpä eli osteosarkooma, degeneratiivinen myelopatia (selkäydinrappeuma) sekä autoimmuunitaudit kuten kilpirauhasen vajaatoiminta, joka hoitamattomana aiheuttaa monenlaisia oireita eri elinten taholla.

Degeneratiivinen myelopatia eli DM

Degeneratiivinen myelopatia on selkäytimen rappeuma, joka hitaasti edeten halvaannuttaa koiran. Oireet alkavat takaosan hallinnan vaikeutumisesta edeten hitaasti eteenpäin. Ensioireet ilmestyvät yleensä keski-ikäen jälkeen 6–9-vuotiaana. Takaosan heikkoutta esiintyy säännöllisesti vanhoilla venäjänvinttikoirilla, mutta DM:n osuudesta niihin ei vielä tiedetä.

On olemassa geenitesti, joka perustuu oletukseen, että sairaus periytyy yhden geeniparin välityksellä ja että se soveltuisi hyvinkin monelle rodulle. Ollaan myös sitä mieltä, että alttiit koirat eli kyseisen mutaation suhteen samaperintäiset (homotsygootit, DM/DM) ovat riskissä sairastua ja kantajat (DM/N) todennäköisesti eivät. Jalostussuositus on, että ainakin toinen vanhemmista on ”terve” eli testaustulos on N/N, jolloin alttiiden pentujen syntyminen vältetään.

Suomen Borzoiklubin nettisivuilla on terveystulostaulukko koirien omistajien toimittamista DM-tutkimustuloksista. Virallisiksi merkitään tulokset, joiden jalostustoimikunnalle lähetetyistä lausunnoista käy ilmi, että koiran tutkimisen tai näytteenoton yhteydessä sen tunnistusmerkintä on tarkistettu ja geenitestissä näytteenottajana on toiminut eläinlääkäri tai Kennelliiton virallinen näytteenottaja. Terveystietotaulukkoon voi lähettää borzoinsa tietoja riippumatta siitä onko koiran omistaja Suomen Borzoiklubin jäsen vai ei. Aineiston perusteella rodun degeneratiivisen myelopatian geenitestituloksia on saatavilla yhteensä 558 koiralta (päivitetty 18.2.2026).

Tulosten jakauma on seuraava:

- Terve (N/N): 262 koiraa (60,5 %)
- Kantaja (N/DM): 162 koiraa (29,0 %)
- Altis (DM/DM): 9 koiraa (1,6 %)
- Syntyperältään terveitä 125 kpl (22,4 %), eli kahden terveeksi (N/N) testatun vanhemman jälkeläisiä.

Suomalaiset borzoikasvattajat ovat todella kiitettävästi testauttaneet jalostukseen käyttämiensä koiria ja tällä tavoin DM-alttiiden koirien määrä on saatu hyvin alhaiseksi. DM-testaus on suosituksena SBK:n pentuvälityspalstalla ja vain pentueet, joissa ainakin toinen vanhempi on DM terve (N/N) pääsevät rotujärjestön pentuvälitykseen.

Sydänsairaudet

Dilatoiva kardiomyopatia on sydänlihassairaus, joka on tunnettu myös venäjänvinttikoirilla. Se on mahdollisesti polygeenisesti periytyvä sairaus, joskaan periytymismekanismeja ei vielä tunneta. Äkillisesti kuolleista, avatuista koirista on löytynyt kardiomyopatian lisäksi myös esim. aortan repeämiä

sekä hemangiosarkoomia. Osasta tutkittuja tapauksia ei löytynyt patologisanatomisia muutoksia ja avauskertomuksissa loppupäätelmäksi on usein tullut sydämen toiminnan vajuus, todennäköisesti rytmihäiriö.

SKL kuolinsyytilaston (otanta 2021–2025) perusteella sydänsairauksia on raportoitu yhteensä 14 koiralla, joista kardiomyopatian osuus on kuudella. Lisäksi on todettu muuta sydämen vajaatoimintaa tai sairautta neljällä sekä tarkemmin määrittelemättömiä sydänsairauksia myös neljällä. Terveyskyselyn aineistossa (n=92) sydän- tai verenkiertosairauksia esiintyi noin 4,4 %:lla koirista, ja yksittäisinä löydöksiä raportoitiin muun muassa sydämen läppävika (1,1 %). Sydänlihassairaus johtaa sydämen vajaatoimintaan, jota alkuvaiheessa voidaan lääkittää ja mahdollistaa lähes normaali elämä. Vajaatoiminta yleensä kuitenkin etenee huolimatta hoidosta ja lopulta päädytään eutanasiaan.

SBK suosittelee sydämen ensisijaiseksi tutkimusmenetelmäksi sydämen ultraäänitutkimusta ja EKG:tä. Pelkkä sydänkuuntelu ei riitä tutkimusmenetelmäksi, sillä esimerkiksi dilatoiva kardiomyopatia kehittää sivuäänien vasta taudin myöhäisessä vaiheessa eikä aina silloinkaan.

Luustosairaudet

Rodun tuki- ja liikuntaelinten terveystilannetta seurataan sekä virallisten terveystutkimusten että terveystutkimusaineiston avulla. Kokonaisuutena luustoterveys on hyvä, ja suurimmalla osalla koirista ei todeta merkittäviä luusto- tai nivelmuutoksia. Yksittäisiä sairauksia ja rakenteellisia poikkeamia kuitenkin esiintyy, minkä vuoksi luustoterveystutkimuksen tulee kiinnittää huomiota jalostusvalinnoissa.

Aikavälillä 2014–2023 syntyneiden koirien niveltutkimusten tulokset

- **Lonkat**
Tarkastelujaksolla suurin osa tutkituista (77 %) oli tervelonkkaisia (A tai B). Lievää lonkkien kasvuhäiriötä (C) esiintyi 21 % tutkituista koirista ja keskivaikeaa (D) oli vain 2 % tutkituista. Vaikeaa lonkkien (E) kasvuhäiriötä ei esiintynyt tutkituilla koirilla. Tulee huomioda, että tarkastelujaksolla syntyneistä koirista vain 19 % on tutkittu lonkkien osalta.
- **Selkä (LTV ja SP)**
Lannerangan välimuotoisten nikamien (LTV) osalta 44 % oli normaaleja (LTV0) ja 36 % oli lieviä poikkeamia (LTV1). Symmetrisiä välimuotoisia lanneristinnikamia (LTV2) esiintyi 1 % tutkituista ja epäsymmetrisiä (LTV3) esiintyi 4 %. Puuttuvia tai ylimääräisiä lanneristinnikamia (LTV4) esiintyi 14 % tutkituista.
Selän osalta spondyloosimuutokset ovat harvinaisia: 98 % tutkituista koirista on saanut tuloksen 0, ja lieviä muutoksia esiintyy 2 %:lla.
Tarkastelujaksolla selkätutkimustulos LTV:n ja SP:n osalta oli 11 % syntyneistä koirista.
- **Kynärät**
Suurin osa tutkituista koirista on kyynäriltään normaaleja (89 %). Lieviä kyynärnivelen kasvuhäiriötä esiintyi 9 % ja kohtalaisia esiintyi 2 % tutkituista koirista. Tarkastelujaksolla syntyneistä koirista 19 % oli tutkittu kyynärien osalta.
- **Polvet**
Patellaluksaatio on rodussa harvinainen. Suurin osa polvien osalta tutkituista koirista on normaaleja polviltaan (97 %) ja lievää luksaatiota on ollut 3 % tutkituista koirista. Vakavampia muutoksia (asteet 2–4) ei aineistossa esiinny. Polvien osalta on tutkittu kuitenkin vain 6 % syntyneistä koirista.
- **Olkaniivelet**
Olkaniivelen osteokondroosia (OCD), on tutkittu rodussa vielä hyvin vähäisesti. Pääosin tulokset ovat olleet puhtaita mutta muutamia sairastuneita yksilöitä on löytynyt. Tutkituista koirista noin 94 %:lla ei todettu olkaniivelen osteokondroosia (OCD). Poikkeavia tai tulkinnanvaraisia löydöksiä esiintyi noin 6 %:lla tutkituista.

Pahanlaatuiset luuston ja ruston kasvaimet

Rodussa esiintyy pahanlaatuisia luuston ja ruston kasvaimia, joista merkittävin on osteosarkooma. Tapaukset sijoittuvat pääasiassa iäkkäämpiin koiriin. Osteosarkooma on aggressiivinen kasvainsairaus, joka etenee nopeasti ja heikentää merkittävästi koiran ennustetta.

Mahalaukun laajentuma ja kiertymä eli GDV (gastric dilatatio et volvulus)

Mahalaukun laajentuma ja kiertymä on välitöntä hoitoa vaativa sairaus, joka johtaa hoitamattomana kuolemaan. Hoidosta huolimatta osa koirista menehtyy. Se on monitekijäinen sairaus, johon vaikuttavat esim. stressi ja ruokinta. Sen geneettinen tausta on epäselvä, mutta perinnöllinen taipumus siihen on olemassa. Muun muassa syvä rintakehä, ruokinta, liikunta ja stressiherkkyys ovat altistavia tekijöitä. Venäjänvinttikoirilla GDV:n arvioidaan liittyvän perinnöllisyyteen, rintakehän muotoon ja ympäristötekijöihin (ruokinta, liikunta). Suomalaisessa tilastossa esiintyvyys noin 3,3 %, todellisuudessa todennäköisesti jonkin verran enemmän.

Kilpirauhasen vajaatoiminta eli hypotyreoosi

Kilpirauhasen vajaatoiminta eli hypotyreoosi on autoimmuunisairaus, jossa elimistö itse tuhoaa hormonia tuottavan kilpirauhasen. Kilpirauhashormonin puute johtaa lukuisiin erilaisiin oireisiin johtuen aineenvaihdunnan hidastumisesta ja yleisen elinvoimaisuuden vähenemisestä. Vajaatoimintaan on kuitenkin poikkeuksellisesti täydellinen korvaushoito, jonka ansiosta koira voi elää lähes normaalia elämää. Terveyskyselyaineistossa kilpirauhasen vajaatoimintaa on raportoitu yksittäistapauksena (1,1 %). Tämän perusteella sairaus ei vaikuta olevan rodussa yleinen.

Autoimmuunisairaudet eivät tietävästi periydy suoraan, mutta alttiuden niihin epäillään periytyvän. Sairastuneita koiria ei käytetä jalostuksessa. Jalostukseen käytettäviltä koirilta suositellaan tutkittavan mahdollisimman lähellä astutusajankohtaa kilpirauhasen toimintaan liittyvät arvot, vaikka kliinisiä oireita ei olisikaan.

Silmäsairaudet

Tarkastelujaksolla 2016–2025 on silmätutkittu yhteensä 94 borzoita. Valtaosalla (94 %) tutkituista koirista ei ole todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. Neljällä koiralla on todettu PHTVL/PHPV-muutoksia, yhdellä kortikaalinen katarakta ja yhdellä muu verkkokalvon sairaus.

Tulosten perusteella perinnölliset silmäsairaudet eivät ole rodussa yleisiä ja tilanne vaikuttaa tällä hetkellä hyvältä. Yksittäisten löydösten vuoksi silmätarkastusten jatkaminen on kuitenkin tärkeää rodun tilanteen seuraamiseksi. Jalostuksessa suositellaan käytettäväksi silmätarkastettuja yksilöitä sekä huomioimaan suvuissa mahdollisesti esiintyvät silmäsairaudet.

Hampaat ja purenta

Terveyskyselyn mukaan rodussa esiintyy pysyvien hampaiden puuttumista. Sekä terveyskyselyn että näyttelyarvostelujen mukaan esiintyy myös tiukkaa purentaa, jolloin alakulmahampaat ovat asettuneet liian ahtaasti. Molemmissa tapauksissa kyseessä on todennäköisesti osittain perinnöllinen ominaisuus, minkä vuoksi hampaisiin ja purentaan tulee kiinnittää huomiota jalostuksessa.

4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt

Koirien omistajilla on mahdollisuus ilmoittaa koiran kuolinaika ja kuolinsyy Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.

Taulukko 11: Yleisimmät kuolinsyyt

Lähde: Jalostustietojärjestelmä 24.8.2026

Kuolinsyy	Keskim. elinikä	Yhteensä
Hengitystiesairaus	8 vuotta 5 kuukautta	17
Hermostollinen sairaus	8 vuotta 0 kuukautta	7
Iho- ja korvasairaudet	7 vuotta 0 kuukautta	4
Immunologinen sairaus	5 vuotta 6 kuukautta	8
Kadonnut	6 vuotta 10 kuukautta	1
Kasvainsairaudet, syöpä	9 vuotta 2 kuukautta	146
Kuollut ilman sairauden diagnosointia	7 vuotta 8 kuukautta	33
Lopetus ilman sairauden diagnosointia	8 vuotta 2 kuukautta	32
Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi	4 vuotta 8 kuukautta	16
Luusto- ja nivelsairaus	6 vuotta 10 kuukautta	21
Maksan tai ruoansulatuskanavan sairaus	6 vuotta 7 kuukautta	49
Muu sairaus, jota ei ole listalla	8 vuotta 3 kuukautta	67
Selkäsairaus	9 vuotta 6 kuukautta	25
Sisäeritysrauhasten sairaus	7 vuotta 3 kuukautta	2
Sydänsairaus	6 vuotta 9 kuukautta	66
Synnytysvaikeus	5 vuotta 3 kuukautta	1
Tapaturma tai liikennevahinko	4 vuotta 11 kuukautta	45
Vanhuus (luonnollinen tai lopetus)	11 vuotta 5 kuukautta	244
Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus	10 vuotta 1 kuukautta	19
Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu	9 vuotta 1 kuukautta	111
Kaikki yhteensä	8 vuotta 11 kuukautta	914

Kennelliiton kuolinsyytaulukon perusteella ei voi rakentaa tarkkaa käsitystä rodun yleisimmistä kuolinsyistä tai keski-ikästä, koska läheskään kaikkien koirien kuolinsyitä ei ilmoiteta. Kuolinsyistä voidaan todeta, että rodussa ei ilmene mitään selkeää ja yleistä letaalia terveyshaittaa nuorella iällä (alle 4-vuotiaat koirat). Eniten koiria on menehtynyt vanhuuteen missä keski-ikä on 11 vuotta ja 5 kuukautta. Varsinaisista sairauksista yleisin kuolinsyy on erilaiset syövät, erityisesti osteosarkooma, eli luusyöpä. Koirien keskimääräinen kuolin-ikä syöpään on kuitenkin 9 vuotta ja 2 kuukautta, joten puhutaan keskimäärin veteraani-ikäisistä koirista. Erilaiset syövät ja erityisesti luusyöpä on merkitty myös rodun kansainvälisessä tietokannassa yhdeksi suurimmista kuolinsyistä. Mediaani-ikä on kansainvälisessä tietokannassa Suomen tilastoja vastaava 9 vuotta (pyöristettynä).

Suomen tilastoinnissa erilaiset sydänsairaudet nousevat korkeaksi kuolinsyyksi ja näissä keski-ikä on myös matalampi (6 v ja 9 kk). Sydänsairaudet ovat korkealla myös kuolinsyytilastoissa kansainvälisessä tietokannassa, missä mediaani-ikä kuolemalle oli pyöristettynä 6 vuotta.

Ruoansulatukseen liittyvissä kuolinsyissä korkeimmaksi nousi mahalaukun kiertyminen (bloat) niin Suomen tilastoinnissa kuin kansainvälisesti. Suomessa keskimääräinen kuolin-ikä 6 vuotta ja 7 kuukautta kun taas kansainvälisesti mediaani-ikä on ollut pyöristettynä 5 vuotta.

4.3.4 Lisääntyminen

Keskimääräinen pentuekoko

Tarkastelujaksolla rodun keskipentuekoko oli keskiarvoisesti 5,4 pentua. Tämä on suurikokoiselle koiralle hieman alhainen keskipentuekoko, mutta keskitasoa, kun verrataan muihin saman kokoluokan vinttikoirarotuihin. Syntyneissä pentueissa on ollut vuositasona muutamia, joissa on ollut vain 1–2 pentua. Osassa astutuksista on käytetty pakastespermaa, mikä voi selittää pienemmän pentuekoot.

Astutukset ja synnytykset

Terveyskyselyn mukaan astumisvaikeuksia on vain yksittäisissä tapauksissa. Suurin osa vastauksista ei viittaa merkittäviin ongelmiin astutuksessa, mutta joissakin tapauksissa on mainittu esimerkiksi nartun haluttomuus astutukseen tai astutuksen onnistuminen vasta useamman yrityksen jälkeen. Yleisesti ottaen urosten lisääntymistoiminta on rodussa tyydyttävällä tasolla. Rotujärjestöaineiston mukaan ajanjaksolla 2016–2025 syntyneistä pentueista 6 on keinosiemennetty pakastespermalla ja 14 tuorespermalla. Synnytyksistä 4 on ollut keisarinleikkauksella ja yksi lääkkein avustettu.

Saatavilla olevan aineiston perusteella astumisvaikeudet eivät näyttäyty rodussa yleisenä ongelmana. On kuitenkin tärkeää seurata, että astuminen onnistuu luonnollisesti. Narttu antaa uroksen hypätä ja uroksen libido on normaali, se kykenee astumaan itse.

Rodulla esiintyy tiinehtymisvaikeuksia satunnaisesti. Terveyskyselyaineiston perusteella ei rodussa ole havaittu merkittäviä ongelmia tiinehtymisessä, mutta osa nartuista ei ole tullut kantavaksi tai on tullut kantavaksi vasta useamman yrityksen jälkeen. Kyselystä ei selviä, onko uroksen spermaa tutkittu näissä tapauksissa.

Synnytyksissä ei yleisesti esiinny merkittäviä ongelmia. Keisarinleikkaus on tarvittu joskus. Suurin osa nartuista hoitaa pennut normaalisti, eikä rodussa näyttäyty merkittäviä pentujen hoitoon liittyviä ongelmia.

Pentukuolleisuus

Rodussa pentukuolleisuudesta ei ole saatavilla kattavaa tilastoitua aineistoa. Rotujärjestöaineiston mukaan vuosina 2016–2025 syntyneistä pennuista syntyi kuolleena 6,7 % pennuista. Aineistosta ei selviä, missä vaiheessa synnytystä tai pentuaikaa pennut ovat kuolleet. Kasvattajien kokemusten perusteella pentukuolleisuus ei kuitenkaan vaikuta rodussa merkittävältä ongelmalta.

Synnynnäiset viat ja epämuodostumat

Terveyskyselyn perusteella valtaosalla rodun koirista ei ole todettu synnynnäisiä vikoja (79,3 %, n = 92). Yleisimmin raportoitu yksittäinen synnynnäinen poikkeama oli pysyvän hampaan puutos (17,4 %). Muita yksittäisiä tapauksia olivat mm. synnynnäinen sydänvika, piilokiveksisyys, virheellinen purenta sekä häntämutka, mutta näiden esiintyvyys oli vähäinen.

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet

Rodussa ei esiinny sairauksille altistavia anatomisia piirteitä. Kiistanalainen kysymys on alaleuan kapeus / heikkous. Sama ongelma esiintyy normaali- ja lyhytkuonoisillakin roduilla, joten se ei ole suoraanaisesti yhteydessä rotumääritelmässä kuvattuun borzoin kapeaan, pitkään kalloon. Jalostuskoirien arvioinnissa suositellaan noudatettavan rotumääritelmän edellytystä voimakkaista leuoista ja terveestä purennasta.

Rodulle tyypillinen syvärintaisuus saattaa osaltaan altistaa mahalaukun laajentumalle ja kiertymälle (GDV) sekä keuhkotulehduksille, mikä tulee huomioida rodun terveystilannetta tarkasteltaessa. Lisääntymisongelmille altistavia anatomisia piirteitä ei rodulla ole.

4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä

Terveyteen liittyvät keskeisimmät ongelmat liittyvät sydämeen, mahalaukun laajentuma/kiertymä-syndroomaan sekä kasvainsairauksista osteosarkoomaan. Luustotutkimusten osalta huomiota on kiinnitettävä selän terveyteen, samoin huomiota on kiinnitettävä myös purentaan. Kilpirauhasen todellinen merkitys sairautena ei osoita tällä hetkellä ongelmaa, mutta sitä on hyvä seurata jatkossa.

Rodussa esiintyvien terveysongelmien taustalla on todennäköisesti useiden tekijöiden yhteisvaikutus. Perinnöllisillä tekijöillä on keskeinen rooli erityisesti sydänsairauksien ja osteosarkooman osalta mutta myös alttius mahalaukun laajentuma- ja kiertymä (GDV) voi liittyä perinnöllisiin sekä rakenteellisiin tekijöihin, kuten rodulle tyypilliseen syvärintaisuuteen. Lisäksi ympäristötekijät, kuten ruokinta, liikunta ja yleinen hoito, voivat vaikuttaa erityisesti GDV:n ilmenemiseen.

4.4. Ulkomuoto

4.4.1 Rotumääritelmä

Venäjänvinttikoiran rotumääritelmä on vahvistettu 5.11.2019 (suom. 20.2.2020). Liite 1.

Yleisvaikutelma: Aristokraattinen, kookas, voimakas, tasapainoinen ja kuivarakenteinen koira, melko korkearaajainen ja rungoltaan suhteellisen kapea. Hieman pitkänomainen; nartut ovat pitkärunkoisempia kuin urokset. Nahka on ohut, joustava ja poimuton. Lihakset ovat litteät, pitkät ja hyvin kehittyneet. Luusto on vahva mutta ei raskas.

Rotumääritelmässä ei ole hyvinvointiongelmille altistavia vaatimuksia. Hylkääviä virheitä ovat mm. viihaisuus tai liiallinen arkuus, selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen, ylä- tai alapurenta, vino purenta, epätäydellinen mutta tiivis etuhammasrivi, yhden tai useamman kulmahampaan puuttuminen, ellei johdu hampaan katkeamisesta, virheellisesti asettuneet kulmahampaat, purenta, joka ei sulkeudu.

4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset

Vuosina 2016–2025 on jalostustietojärjestelmän mukaan ollut yhteensä 7 145 näyttelykäyntiä, joista 78 % koira on saanut laatuarvostelun erinomainen ja 18 % laatuarvostelun erittäin hyvä. Näin tarkasteltuna koirien ulkomuodollinen tason on erittäin korkea. Hylätty arviointi on annettu 42 kertaa, syynä kulmahampaiden virheellinen asento. Huomionarvoista on, että ainoastaan yhden koiran osalta tämä on sen ainoa tulos, osa hylätyn tuloksen saaneista on jopa kansainvälisiä muotovalioita. Purennan arvostelulinja ei siten vaikuta olevan kaikilla tuomareilla yhtenevä.

Taulukko 12: Näyttelykäynnit vuosina 2016–2025

Lähde: Jalostustietojärjestelmä 30.3.2026

	ERI	EH	H	T	EVA	HYL	Yhteensä
Junioriluokka	927 tulosta	361 tulosta	60 tulosta	3 tulosta	11 tulosta	11 tulosta	1373 tulosta
Nuorten luokka	669 tulosta	174 tulosta	41 tulosta	0 tulosta	5 tulosta	1 tulosta	890 tulosta
Avoin luokka	1183 tulosta	482 tulosta	65 tulosta	5 tulosta	11 tulosta	24 tulosta	1770 tulosta
Käyttöluokka	139 tulosta	26 tulosta	2 tulosta	0 tulosta	2 tulosta	0 tulosta	169 tulosta
Valioluokka	2088 tulosta	164 tulosta	13 tulosta	3 tulosta	7 tulosta	4 tulosta	2279 tulosta
Veteraaniluokka	586 tulosta	65 tulosta	2 tulosta	2 tulosta	7 tulosta	2 tulosta	664 tulosta
Yhteensä	5592 tulosta	1272 tulosta	183 tulosta	13 tulosta	43 tulosta	42 tulosta	7145 tulosta

Rodun koirien jalostustarkastukset

Rodun omia ulkomuodon jalostustarkastuksia on järjestetty 2009 ja 2011, joissa on tarkastettu yhteensä 8 urosta ja 13 narttua. Kennelliiton virallisia ulkomuodon jalostustarkastuksia ei ole järjestetty.

4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus

Näöllään ja nopeudellaan metsästävän venäjänvinttikoiran tärkeimpiä rakenteellisia ominaisuuksia ovat tasapainoisesti kulmautuneet, lihaksikkaat raajat ja leveä, voimakas ja joustava selkä sekä vahvat leuat ja isot hampaat. Vinttikoirien maastajuoksukokeissa voidaan testata mahdollistaako koiran rakenne sen suoriutumisen rodun alkuperäisessä käyttötarkoituksessa.

4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista

Näyttelyarviointien perusteella keskeisin ongelma liittyy ahtaaseen purentaan ja virheellisesti asettuneisiin kulmahampaisiin.

5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA

Rodun edellisen jalostuksen tavoiteohjelman voimassaolokausi

Edellinen jalostuksen tavoiteohjelma (päivitys) on vahvistettu vuosille 2022–2025.

Rodun ensimmäisen tavoiteohjelman voimassaolokausi

Venäjänvinttikoirien ensimmäinen jalostuksen tavoiteohjelma on hyväksytty SBK:n kevätkokouksessa 1995 ja SVKL:n syyskokouksessa 1995 ja vahvistettu SKL:n jalostustieteellisessä toimikunnassa. Seuraava tavoiteohjelma hyväksytty SVKL:n kokouksessa 10.6.2008. Vuonna 2015 hyväksytty jalostuksen tavoiteohjelma korvasi aikaisemman kokonaisuudessaan. Vuonna 2021 on tehty edellisen ohjelman päivitys, joka on voimassa 2022–2026.

5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso

Käytetyimpien urosten ja narttujen jälkeläistilastot ovat jalostuksen tavoiteohjelman liitteinä 2–3.

5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen

Taulukko 13: Edellisen tavoiteohjelman (2022–2026) toteutuminen

Tavoite	Toimenpide	Tulos
Rotumääritelmän mukaisen aristokraattisen ja ylvään, osin pidättyväisenkin luonteen säilyttäminen.	Arkoja tai aggressiivisia yksilöitä ei saa käyttää jalostukseen.	Toteutunut. Tätä tukemaan on laadittu ihanneprofiili käyttäytymisen jalostustarkastukseen.
Terveyden edistäminen / ylläpito	Ennen jalostukseen käyttöä koirille suositellaan tehtäväksi DM-geenitesti, Kennelliiton virallinen sydämen	Toteutunut osittain. 20 käytetyimmän uroksen ja nartun terveystutkimukset: - DM-testi: urokset 40 %, nartut 100 % - Sydämen UÄ: urokset 15 %, nartut 100 %

	ultraäänitutkimus ja Kennelliiton virallinen silmätutkimus. Muita terveystutkimussuosituksia ovat kilpirauhasarvojen määrittäminen, sekä toissijaisina tutkimuksina Kennelliiton viralliset röntgenkuvaukset.	nartut 25 % • Silmät: urokset 10 %, nartut 40 % • Kilpirauhasarvot: ei tilastotietoa • Röntgenkuvauksia: urokset: 20 %, nartut 35 %
Elinvoiman säilyttäminen	Sukusiitosaste korkeintaan 6,25 % tai sen alle, laskettuna kuudella sukupolvella.	Toteutunut. Jalostustietojärjestelmän vuositilaston mukainen sukusiitosprosentti vuosina 2016–2025 on ollut 2,2 %.
Terveen ja toimivan rakenteen säilyttäminen	Jalostukseen käytettävällä nartulla ja uroksella suositellaan olevan vähintään laatuarvostelun ”hyvä” -palkinto virallisesta näyttelystä vähintään 15kk iässä tai hyväksytty jalostustarkastus.	Toteutunut. 20 käytetyimmällä uroksella (taulukko 3) ja nartulla (taulukko 4) on kaikilla vähintään toivottu näyttelytulos.
Käyttöominaisuuksien säilyttäminen	Käyttöominaisuuksia yritetään ylläpitää rata-, maasto- ja ajuejuoksukilpailuilla ja -harjoituksilla.	Toteutunut osittain. 20 käytetyimmistä uroksista (taulukko 3) 40 % ja nartuista (taulukko 4) 35 % on käyttökoetulos
Geneettisen monimuotoisuuden säilymisen turvaaminen	Kasvattajia kannustetaan suosimaan yhdistelmiä, joissa jalostukseen käytettävät yksilöt ovat mahdollisimman kaukaista sukua keskenään. Ulkomailta tuotavia erilinjaisia koiria suositellaan käytettäväksi jalostukseen ja jalostuskoirien jälkeläismäärissä suositellaan Kennelliiton jalostusstrategian sekä JTO:n ohjeiden noudattamista. Lähisukulaisyhdistelmiä (isä/emä + jälkeläinen ss% 25, täyssisarukset ss% 25) ei tule tehdä.	Toteutunut. Sisäsiitosaste on matala, lähisukulaisyhdistelmiä ei ole tehty. Ulkomailta on tuotu uusia jalostuskoiria ja ulkomaisia uroksia on käytetty myös pakastesperman avulla. Vuosina 2016–2025 rekisteröidyistä pentueissa 35 % emistä ja 49 % isistä oli joko tuonteja tai ulkomaisia koiria.

Jalostuksen ulkopuolelle jäävien koirien osuus

Venäjänvinttikoirien vähäisen pentuemäärän takia jalostuksen ulkopuolelle jää varsin iso osa syntyneistä pennuista.

Jalostussuositusten ja PEVISAn ajantasaisuuden arviointi

Rodulla ei ole edelleenkään tarvetta PEVISAn käyttöönottoon. Jalostussuosituksiin lisätään viralliset luustokuvaukset selän, lonkkien ja kyynärpäiden osalta. Rotujärjestön pentuvälityspalstalla esitettävät tiedot yhdenmukaistetaan jalostussuositusten kanssa.

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

6.1 Jalostuksen tavoitteet kaudelle 2027 - 2031

Jalostuksen tavoitteet asetetaan populaation, luonteen ja käyttäytymisen, käyttöominaisuuksien, terveyden ja lisääntymisen sekä ulkomuodon osalta.

Venäjänvinttikoiran jalostuspohja Suomessa on varsin kapea. Tavoitteena on populaation kasvattaminen ja rodun monimuotoisuuden turvaaminen. Jalostukseen tarvitaan jatkossakin tuontikoiria sekä tuontispermaa.

Ulkomuodon osata olennainen tavoite on kapeiden alaleukojen vähentäminen. Tavoitteena on, että hampaista ei aiheudu koiralle terveydellistä haittaa.

Venäjänvinttikoiria on rotumääritelmän mukaan metsästyskoira sekä rata- ja maastajuoksu-koira. Metsästäminen vinttikoiran avulla on maassamme kuitenkin kiellettyä, joten käyttöominaisuuksia yritetään ylläpitää rata-, maasto- ja ajuejuoksu-koikeilla ja -harjoituksilla. Ulkomuoto säilyy, kun pidetään mielessä, että rotumääritelmä kuvaa tuulennopeaa, ketterästi laukkaavaa metsästyskoiraa.

Venäjänvinttikoiran toivotaan säilyttävän rotumääritelmän mukaisen aristokraattisen ja ylvään, osin pidättyväisenkin luonteensa. Arkoja tai aggressiivisia yksilöitä ei saa käyttää jalostukseen.

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille

Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista

- Nartun tulee olla astutushetkellä vähintään 24 kk ja enintään 8-vuotias. Kahdeksan vuotta täyttäneen nartun astuttaminen edellyttää aina eläinlääkärintodistuksen, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa nartun terveydelle.
- Uroksen tulee olla astutushetkellä vähintään 24 kk ikäinen.
- Yhdistelmän **sukusiitosaste ei ylitä 6,25 %** laskettuna 5-sukupolven mukaan.
- Molemmilla vanhemmilla on astutushetkellä
 - **DM-geenitesti.** Vähintään yhdistelmän toisen osapuolen tulee olla testattu terveeksi (N/N).
 - **Virallinen sydämen ultraäänitutkimus ja vähintään 5 min lepo-EKG.** Lausunto on voimassa 24 kuukautta. Viitteitä muutoksiin ei saa löytyä.
 - **Virallinen silmälausunto** tuloksella ”ei todettu perinnöllisiä silmänsairauksia”. Alle 3-vuotiaana saatu lausunto on voimassa 24 kk. Yli 3-vuotiaana tutkittua koiraa ei tarvitse tutkia uudelleen.
 - **Virallinen selkälausunto (LTV, spondyloosi).** Vähintään yhdistelmän toisen osapuolen tulee olla tutkittu terveeksi.
 - **Virallinen lonkkadysplasialausunto.** C-lausunnon saanut koira suositellaan yhdistämään vain terveeseen (A tai B) kumppanin kanssa. D-tai huonomman lausunnon saanutta ei suositella käytettäväksi jalostukseen lainkaan.
 - **Normaalit kilpirauhasarvot.** Tutkittavia arvoja ovat T4 ja TSH sekä tarvittaessa vapaa-

T4. Tulosten suhteen on huomioitava vinttikoirien alaiset hormoniarvot

- Molemmilla vanhemmilla on vähintään laatuarvostelun ”erittäin hyvä” -palkinto virallisesta näyttelystä vähintään 15kk iässä tai hyväksytty jalostustarkastus.
- Molemmilla vanhemmilla on hyväksytty tulos joko rata-, maasto- tai ajuejuoksukokeista.

Rotujärjestö ei suosittele koirien jalostuskäyttöä, jos

- Koiralla on purentavika tai niin kapea alaleuka, että alakulmahampaat osuvat kitalakeen.
- Yhdistelmän molemmilla koirilla on kivesvikaisia lähisukulaisia (täysveljiä).
- Koiralla on häntämutka tai muu rotumääritelmässä mainittu hylkäävä virhe.
- Yhdistelmän sukusiitosaste ylittää 6,25 (viisi sukupolvea).
- Nartulle on tehty 2 keisarinleikkausta.

Suositus yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärälle

Kennelliiton Jalostusstrategian mukainen yleinen suositus on, että yhdenkään koiran elinikäinen jälkeläismäärä ei ylitä 5 % rodun populaatiossa yhden sukupolven (4 v) jaksolla rekisteröidyistä pennuista. Urosten jälkeläismäärän tulee jakautua mahdollisimman tasaisesti eri vuosille.

Jälkeläismäärää arvioitaessa rodun populaation kokoa tulee tarkastella paitsi kansallisella myös kansainvälisellä tasolla, erityisesti yksilömäärältään pienissä roduissa. Rotujärjestöaineiston mukaan viimeisimmän sukupolven (2022–2025) syntyvyyden perusteella lasketut enimmäisjälkeläismäärien suositus 1. polvessa on vain 7 kpl eli 1–2 pentuetta.

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet

Rotujärjestön keinoja jalostuksen ohjaamisessa jalostuksen tavoiteohjelmassa kuvattuun suuntaan:

- Kasvattajien neuvonta ja koulutus jalostuksen tavoiteohjelman noudattamiseen
- Rotujärjestön pentuvälityspalstan suositukset päivitetään vastaamaan jalostussuosituksia
- Järjestetään ulkomuodon jalostustarkastus koirille, jotka eivät käy näyttelyissä
- Järjestetään käyttäytymisen jalostustarkastuksia
- Järjestetään joukkoterveystarkastuksia
- Seurataan sairauksien esiintyvyyttä
- Valmistellaan luonne- ja kotikäyttäytymiskysely sekä terveys- ja lisääntymiskysely ja toteutetaan kysely ennen seuraava jalostuksen tavoiteohjelman valmistelua
- Ulkomuototuomarien koulutuksessa tuodaan esille mm. kapeiden alaleukojen huomioiminen arvostelussa.
- Yhteydenpito muihin maihin

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin

Rodun jalostuksen suurimmat uhat ja mahdollisuudet

Mahdollisuudet:

- Rotu on pääsääntöisesti hyväluonteinen eikä siinä ole todettu laajasti esiintyviä vakavia sairauksia.
- Suomessa venäjänvinttikoirien taso näyttely- että käyttöominaisuuksien osalta on varsin korkea ja tasainen.
- Jalostusmateriaalia on mahdollista käyttää nykyistä laajemmin, myös erisukuisten koirien tuonti ulkomailta on lisääntynyt.
- Venäjänvinttikoiraharrastajat osallistuvat aktiivisesti sekä näyttelyihin että kokeisiin.

Uhat:

- Pelkkään ulkonäköön tai käyttöominaisuuksiin pohjautuva jalostus eriyttää rodun käyttö- ja näyttelylinjoihin.
- Ilman aktiivista uuden jalostusmateriaalin hankintaa populaation monimuotoisuus supistuu entisestään ja sukusiitosaste nousee liian korkeaksi.
- Ilman suunnitelmallista seurantaa perinnölliset sairaudet uhkaavat lisääntyä.

Vahvuudet

- Geenipohja on jonkin verran laajentunut erisukuisten tuontikoirien ansiosta.
- Venäjänvinttikoiria ei ole ns. muotirotu, joten pentutehtailu ei ole ongelma.
- Luonteet ovat pääsääntöisesti hyvät.

Heikkoudet

- Jalostusmateriaalia hukkaantuu vähäisen kasvatustyön johdosta.
- Luotettavan tilastotiedon kerääminen koirien sairauksista ja kuolinsyistä on hankalaa.
- Rotua on terveystutkittu vähän. Tulosten vähyyden perusteella on mahdoton vetää luotettavia johtopäätöksiä rodun terveydestä.

Varautuminen ongelmiin

- Kannustetaan kasvattajia ja harrastajia käyttämään koiriaan terveystutkimuksissa.
- Järjestetään käyttäytymisen jalostustarkastustilaisuuksia.
- Ylläpidetään yhdistyksen terveystulostaulukkoa DM-testien osalta ja julkaistaan terveystutkimustuloksia yhdistyksen lehdessä.

6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta

Vuosi	Tehtävä tai projekti
2027 - 2031	Julkaistaan terveystutkimustuloksia yhdistyksen lehdessä. Ylläpidetään terveystulostaulukkoa DM-testien osalta yhdistyksen nettisivuilla.
2027 - 2031	Pyritään järjestämään käyttäytymisen jalostustarkastustilaisuuksia
2027 - 2031	Pyritään järjestämään ulkomuodon jalostustarkastus
2027 - 2031	Pyritään järjestämään terveysaiheisia luentoja kasvattajille ja harrastajille esimerkiksi vuosikokousten yhteydessä.
2027 - 2031	Kannustetaan harrastajia vastaamaan Kennelliiton ylläpitämään terveystutkimukseen.
2027 - 2030	Valmistellaan luonne- ja kotikäyttäytymiskysely sekä terveys- ja lisääntymiskysely ja toteutetaan kysely
2027 - 2031	Seurataan JTO:n tavoitteiden toteutumista vuosittain.
2030 - 2031	JTO:n päivitys vuosille 2032 - 2036.

Jalostuksen tavoiteohjelman vaikutuksen seuraaminen

JTO:n toteutumista seurataan ja toteutuneesta toiminnasta raportoidaan vuosittain rotujärjestön toimintakertomuksessa ja yleiskokouksessa.

7. LÄHTEET

- Suomen Kennelliiton internetsivut
- Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmä
- Suomen Kennelliiton rotujärjestöaineisto
- Suomen Kennelliiton terveystutkimus, venäjänvinttikoirat
- Suomen Vinttikoiraliitto ry:n kilpailutietojärjestelmä (<https://kilpailut.suomenvinttikoiraliitto.fi>)
- The Breed Archive/borzoi -tietokanta

- Venäjänvinttikoiran rotumääritelmä FCI 5.11.2019 - SKL-FKK 20.2.2020
- Suomen Kennelliiton yleinen jalostusstrategia 2024–2028
- Falconer and Mackay, 1996, Introduction to quantitative genetics
- FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), 2013, In vivo conservation of animal genetic resources. FAO animal production and health guidelines
- Koiran mahalaukun laajentuma ja kiertymä. Kirjallisuuskatsaus ja retrospektiivinen tutkimus toipumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Pirre Lamposaari 2010.
- Suomen Borzoiklubi ry Terveystutkimustilasto (DM)

8. LIITTEET

Liite 1	Jalostustilasto, urokset
Liite 2	Jalostustilasto, nartut
Liite 3	Venäjänvinttikoina rotumääritelmä FCI 5.11.2019 - SKL-FKK 20.2.2020
Liite 4	Käyttäytymisen jalostustarkastuksen ihanneprofiili venäjänvinttikoiralle

LIITE 1

Jalostustilasto – urokset, pentueen rekisteröintivuosi 2016–2025

Uros	Synt. vuosi	Pennut Pentueet	Yhteensä	Vuoden aikana	Toisessa polvessa	Lonkat Tutkittu	Sairas	Tutkittu %	Sairas %	Kyynärnivelet Tutkittu	Sairas	Tutkittu %	Sairas %	Polvet Tutkittu	Sairas	Tutkittu %	Sairas %	Silmät Tutkittu	Sairas	Tutkittu %	Sairas %
FI MVA ZATRAVIN KRASNİK	2019	2	13	0	11	2	0	15 %	0 %	2	0	15 %	0 %	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
FI MVA TAIGATASSUN CAPTAIN DRAKE	2018	2	12	0	0	4	0	33 %	0 %	4	1	33 %	25 %	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
ZATRAVIN QASIM	2023	1	11	11	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
FI KVA-M FI MVA FI VMVA EE MVA EE VMVA EE JMVA DOROGOI VON ALSHAMINA	2016	2	10	0	0	4	2	40 %	50 %	4	0	40 %	0 %	1	0	10 %	0 %	0	0	0 %	*
C.I.B. FI MVA FI JMVA EE MVA SE MVA NO MVA ARCTICW- 25ZIVANOVA'S EFIMER NEVSKIJ	2022	1	9	0	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
FI MVA EE MVA JV-18 V-18YEGOROV SHADOW AND LIGHT	2017	1	9	0	6	1	1	11 %	100 %	1	0	11 %	0 %	0	0	0 %	*	1	0	11 %	0 %
EUGENIAN TALENTED THOR	2022	1	9	9	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
ZIVANOVA'S DVOINOI NAGRAD	2020	1	8	0	9	4	2	50 %	50 %	4	0	50 %	0 %	2	0	25 %	0 %	3	0	38 %	0 %
FI MVA HeJV-19 JV-19CAPOLAVORO IVANHOE SYMPHONY OF GOLDEN-WES	2018	1	8	8	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
CHARLOTTE'RUSSE QUINN QUINTUS	2016	1	7	0	0	1	0	14 %	0 %	2	0	29 %	0 %	1	0	14 %	0 %	1	0	14 %	0 %
C.I.B. C.I.B.-V NORDIC VMVA FI MVA FI VMVA EE VMVA SE MVA NO MVA DK MVA EE MVA LV MVA NL VMVA RU MVA LV VMVA LT JMVA LV JMVA CZ VMVA HeJV-16 EEV-18 RIGAW-18 PMV-22 HeVW-23 HeCW-25 LVW-24 SEVW-24 RIGAW-24 RIGAW-24 NLVW-24 PMVW-24 TLNVetWCup-25 EUVW-25 EEVW-25 PHAEDRA VODNYK	2015	1	6	0	6	1	0	17 %	0 %	1	0	17 %	0 %	0	0	0 %	*	1	0	17 %	0 %
EE JMVA RAJALINJAN PHAEDRA PAVEL	2020	1	6	0	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
C.I.B. FI MVA FI VMVA EE MVA LV MVA SE MVA EE VMVA LT MVA BALT MVA LV VMVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA BALTV- 17 HeW-19 TLNW-20 EEV-22 HeW-22 EEV-24 V-24 VV-24 HeVW- 24 VMV-25 BALTV-25 HeVW-25 VV-25 SEVW-25 TARIJEMIRAN HIDALGO	2016	3	6	0	10	1	0	17 %	0 %	1	0	17 %	0 %	1	1	17 %	100 %	2	1	33 %	50 %
YEGOROV KEEP SHINING	2019	1	6	0	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
FI MVA FI KVA-VIR ZIVANOVA'S DRAGOTSENNYI NEFRIT	2020	1	6	0	0	5	1	83 %	20 %	5	0	83 %	0 %	2	0	33 %	0 %	1	0	17 %	0 %
C.I.B. NORDIC MVA FI MVA SE MVA NO MVA DK MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA EE JMVA TLNW-20 LTV-22 NOV-22 BALTV- 22 TLNW-23 AGRIAW-23 EUCW-23 HeW-23 TLNW-24 KAZAR ZWAROVSKI TARIJEMIRAN	2019	1	6	0	0	1	0	17 %	0 %	1	1	17 %	100 %	0	0	0 %	*	1	1	17 %	100 %
C.I.B. C.I.B.P. FI KVA-VIC FI MVA SE MVA EE MVA EEV- 21TSAARIKON ALEKSANTERI SUURI	2017	1	5	0	0	1	0	20 %	0 %	1	0	20 %	0 %	0	0	0 %	*	1	0	20 %	0 %
SE MVA NO MVA DK MVA HeJV-21 V-22 V-23 MV-25 HeW-25 V- 25JAJEJUKAN KARIJALA TAKAS	2020	1	5	5	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
SENEZH	2019	1	5	0	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
FI MVA SE MVA SCHEZTAYA VELVET GOLDMINE	2018	1	5	0	5	1	0	20 %	0 %	1	0	20 %	0 %	1	0	20 %	0 %	1	0	20 %	0 %
FI MVA FI JMVA SE MVA NO MVA EE MVA BOLSHAIJAN IPSILON	2021	1	5	0	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
FI MVA CARS IVANS PRINCE PARIS	2018	1	4	0	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
STARAJA RUSSA PAMFIL	2018	1	4	0	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
FI MVA ALMAZ RADENA SLOVAKIA	2015	1	3	0	11	1	0	33 %	0 %	1	0	33 %	0 %	0	0	0 %	*	1	0	33 %	0 %
FI MVA JV-21 STARAJA RUSSA RADEK	2020	1	2	0	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
VESNOI ZIMNIE ZAMETKI	2017	1	1	0	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
BARSKAYA PRIKHOT KUMACH	2014	1	1	0	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
RAINMAKER QUATTRO	2019	1	1	0	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
CAVALLIERIK RAIAH	2018	1	1	1	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*

LIITE 2

Jalostustilasto – nartut, pentueen rekisteröintivuosi 2016–2025

Narttu	Synt. vuosi	Pennut Pentueet	Yhteensä	Vuoden aikana	Toisessa polvessa	Lonkat Tutkittu	Sairas	Tutkittu %	Sairas %	Kyynärnivelet Tutkittu	Sairas	Tutkittu %	Sairas %	Polvet Tutkittu	Sairas	Tutkittu %	Sairas %	Silmät Tutkittu	Sairas	Tutkittu %	Sairas %
VASART SUDARUSKA	2017	2	13	0	0	3	1	23 %	33 %	4	0	31 %	0 %	1	0	8 %	*	1	0	8 %	*
C.I.B. FI MVA DK MVA NO MVA LT JMVA LTJV-20 CAVALLIERIK TROPICANKA	2019	2	13	5	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
C.I.B. C.I.B. -V FI MVA FI VMVA EE VMVA DK MVA EE MVA LV MVA RU MVA BY MVA LT VMVA RKVF HeW-21 VV-21 HeW-22 NLV-22 NLV-22 PHAEDRA UMA	2012	2	11	0	6	1	0	9 %	*	1	0	9 %	*	0	0	0 %	*	1	0	9 %	*
C.I.B. -J FI MVA FI JMVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA RIGAW-23 RIGAW-24 EUGENIAN SECRET SAGA	2022	1	11	11	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
FI MVA FI JMVA NO MVA DK MVA LV MVA ZATRAVIN OLENA	2022	1	11	11	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
C.I.B. FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA EUGENIAN LADY LEIA	2018	1	10	0	20	1	0	10 %	0 %	1	0	10 %	0 %	2	0	20 %	0 %	2	0	20 %	0 %
C.I.B. FI MVA NO MVA EE MVA YEGOROV DIVINE DELIGHT	2019	1	10	0	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
STAZCEK'S MY BEAUTIFUL LEAH	2018	1	10	0	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
FI KVA-M FI MVA FI VMVA EE MVA ZATRAVIN IRINJA	2016	2	9	0	0	1	0	11 %	0	1	0	11 %	0	0	0	0 %	*	1	0	11 %	0
GINWITHTONIC WEISS GELB ODER GRAU	2022	1	9	9	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
SUNBURST BARONWOOD'S ROYAL OF GOLDEN SYMPHONY	2012	1	9	0	13	1	1	11 %	100 %	1	1	11 %	100 %	0	0	0 %	*	1	0	11 %	0 %
FI MVA NO MVA EE MVA YEGOROV BRILLIANT MOONBEAM	2019	1	9	0	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
FI MVA FI VMVA TARUEMIRAN JAZMELUCA	2017	1	8	0	0	4	0	50 %	0 %	4	1	50 %	25 %	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
SIMPLE OBSESSION URSA MAJOR GOLDEN-WEST	2020	1	8	8	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
FI MVA EE MVA LV MVA WERNAJA TSAR BORZOIS	2014	1	8	0	14	6	2	75 %	33 %	6	1	75 %	17 %	1	0	12 %	0 %	1	0	12 %	0 %
STARAJA RUSSA OGRIFINA	2016	1	8	0	2	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
LYNK RED ROSE	2015	1	7	0	13	3	1	43 %	33 %	3	0	43 %	0 %	0	0	0 %	*	1	0	14 %	0 %
FI KVA-VIC ZATRAVIN JIRINA	2018	1	7	0	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
FI MVA FI VMVA ZIVANOVA'S CELINA MOLNIA	2016	1	6	0	0	5	1	83 %	20 %	5	0	83 %	0 %	2	0	33 %	0 %	1	0	17 %	0 %
C.I.B. FI MVA SE MVA NO MVA EE MVA HeW-18 V-21 HeW-22 YEGOROV GOLDEN LEAVES	2017	1	6	0	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
ZATRAVIN MILADA	2020	1	6	0	11	2	0	33 %	0 %	2	0	33 %	0 %	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
C.I.B. FI MVA EE MVA LV MVA DK MVA LV JMVA EE JMVA BALTV-18 RIGAW-18 JV-18 BALTV-19 HeW-25 RAJALINIAN OVER THE OCEAN	2017	1	6	0	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
SUDARYNYA IZ SEVERNOI OHOTY	2018	1	5	0	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
NASLEDNITSA	2017	1	5	0	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
FAIR ISLE ROSINA-PEPITA	2021	1	5	0	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
C.I.B. FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA LT GR MVA BALT MVA LT JMVA EEV-21 BALTV-22 HeW-25 LUNNAJA RADUGA LAVANDA	2019	1	5	0	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
FI MVA WHITE ARMY STEPPOWY GONIEC	2014	1	5	0	5	1	0	20 %	0 %	1	0	20 %	0 %	1	0	20 %	0 %	1	0	20 %	0 %
FI MVA LV MVA CAPOLAVORO IRISA SYMPHONY OF GOLDEN-WEST	2018	1	5	5	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
C.I.B. -V FI MVA FI VMVA EE MVA LV MVA EE VMVA TAIGATASSUN BURNING LOVE	2016	1	4	0	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
FI MVA STARAJA RUSSA QALISA	2019	1	4	0	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
TARASOV'S NERQUI	2019	1	2	0	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
STARAJA RUSSA PODSOLNUH	2018	1	2	0	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
C.I.B. FI MVA SE MVA EE MVA HeW-19 TLNW-21 TAIGATASSUN CAPTAIN LADY KILLIGREW	2018	1	1	1	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
LT JMVA LVJV-18 GLORIA IZ SEVERNOI OHOTY	2017	1	1	0	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
BARSKAYA PRIKHOT ZHIMOLOST	2016	1	1	0	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*
US MVA BOLSHAIAN ILEENE	2021	1	1	1	0	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*	0	0	0 %	*